

ANNALES DE L'I. H. P., SECTION A

A. CRUMEYROLLE

Errata d'articles antérieurs

Annales de l'I. H. P., section A, tome 23, n° 3 (1975), p. 275

http://www.numdam.org/item?id=AIHPA_1975__23_3_275_0

© Gauthier-Villars, 1975, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Annales de l'I. H. P., section A » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

<http://www.numdam.org/>

ERRATA D'ARTICLES ANTÉRIEURS

A. CRUMEYROLLE

1. Groupes de spinorialité.

Ann. Inst. Henri Poincaré, Vol. XIV, n° 4, 1971, p. 309-323.

- p. 310, ligne 9 du bas, lire : « ... isomorphe, de même classe de repères ».
- p. 311, prop. 2, ligne 8 du bas, lire : « ... toute autre classe linéairement Pin Q' -isomorphe est de la forme... ».
On tiendra compte de cette précision p. 312 et p. 314 (Prop. 3 bis).
- p. 314, ligne 3 du bas, lire : $ff' \neq 0 \Rightarrow C(Q')f \neq C(Q')f'$.
- p. 319, prop. 7, lire « réductible dans $O(Q')$ ».
- p. 320, ligne 18, lire $k \neq 0$ et $k \neq r$.
ligne 1 du bas, lire : $u = \alpha x_1 y_1 + \gamma x_2 y_1 + \bar{\gamma} y_1 y_2 + k$, $\alpha + k \neq 0$.
en note du bas de page : $\mathcal{L}(H) = 0$.
- p. 321, lignes 20, 21, 22, lire $\hat{\mathfrak{S}}_0$ au lieu de \mathfrak{S}_0 .