

# BULLETIN DE LA S. M. F.

TH. CARONNET

## Sur des couples de surfaces applicables

*Bulletin de la S. M. F.*, tome 21 (1893), p. 134-140

[http://www.numdam.org/item?id=BSMF\\_1893\\_\\_21\\_\\_134\\_1](http://www.numdam.org/item?id=BSMF_1893__21__134_1)

© Bulletin de la S. M. F., 1893, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Bulletin de la S. M. F. » (<http://smf.emath.fr/Publications/Bulletin/Presentation.html>) implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/legal.php>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme  
Numérisation de documents anciens mathématiques

<http://www.numdam.org/>

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS.

---

*Sur des couples de surfaces applicables;*  
par M. TH. CARONNET.

1. Étant données deux surfaces applicables l'une sur l'autre, la distance  $M, M_2$  des points correspondants varie en général avec la position de ces points sur les surfaces qu'ils décrivent.

Nous nous sommes demandé s'il existait des couples de surfaces applicables pour lesquelles cette distance fût constante. La solution de cette question, que nous donnons ici, montre que notre hypothèse était plausible; il existe, en effet, des surfaces applicables l'une sur l'autre et telles que la distance  $M_1 M_2$  de deux points correspondants est invariable.

Ces surfaces peuvent se diviser en deux groupes. Les coordonnées rectangulaires d'un point quelconque d'une surface du premier groupe dépendent de deux fonctions arbitraires d'arguments différents.

Les surfaces du second groupe sont réglées et se correspondent par génératrices parallèles et de même sens; elles dépendent de deux fonctions arbitraires d'un même argument.

Au point de vue de la déformation, ce dernier résultat n'est pas nouveau; M. Beltrami a montré effectivement qu'il existe toujours deux surfaces réglées applicables l'une sur l'autre et dans lesquelles les génératrices correspondantes sont parallèles et de même sens (1).

2. Soient deux surfaces  $(M_1)$ ,  $(M_2)$  applicables l'une sur l'autre et telles que la distance  $M_1 M_2$  des points correspondants soit constante et égale à  $l$ .

Appelons  $x_1, y_1, z_1; x_2, y_2, z_2$  les coordonnées des points  $M_1, M_2$ ;  $x, y, z$  celles du milieu  $O$  de la droite qui les joint, et  $\xi, \eta, \zeta$  les cosinus directeurs de cette droite.

Nous aurons

$$(1) \quad \begin{cases} x_1, y_1, z_1 = x, y, z + (\xi, \eta, \zeta) \frac{l}{2}, \\ x_2, y_2, z_2 = x, y, z - (\xi, \eta, \zeta) \frac{l}{2}. \end{cases}$$

Les deux surfaces en question étant applicables l'une sur l'autre, il vient

$$\int dx_1^2 = \int dx_2^2,$$

ou bien

$$(2) \quad \int dx d\xi = 0.$$

---

(1) Voir G. DARBOUX, *Leçons sur la Théorie générale des surfaces*. Troisième Partie, p. 298.

Par conséquent, la surface lieu du milieu  $O$  correspond à la sphère par orthogonalité des éléments; et, après avoir posé

$$\xi = \frac{\alpha + \beta}{1 + \alpha\beta}, \quad \eta = i \frac{\alpha - \beta}{1 + \alpha\beta}, \quad \zeta = \frac{1 - \alpha\beta}{1 + \alpha\beta},$$

nous aurons

$$(3) \quad \mathbf{S} \frac{\partial \xi}{\partial \alpha} \frac{\partial x}{\partial \alpha} = 0,$$

$$(4) \quad \mathbf{S} \frac{\partial \xi}{\partial \beta} \frac{\partial x}{\partial \beta} = 0,$$

$$(5) \quad \mathbf{S} \frac{\partial \xi}{\partial \alpha} \frac{\partial x}{\partial \beta} + \mathbf{S} \frac{\partial \xi}{\partial \beta} \frac{\partial x}{\partial \alpha} = 0.$$

Les équations (3) et (4) s'écrivent encore

$$(1 - \beta^2) \frac{\partial x}{\partial \alpha} + i(1 + \beta^2) \frac{\partial y}{\partial \alpha} - 2\beta \frac{\partial z}{\partial \alpha} = 0,$$

$$(1 - \alpha^2) \frac{\partial x}{\partial \beta} - i(1 + \alpha^2) \frac{\partial y}{\partial \beta} - 2\alpha \frac{\partial z}{\partial \beta} = 0,$$

et nous donnent après intégration

$$(3)' \quad (1 - \beta^2)x + i(1 + \beta^2)y - 2\beta z = B(\beta),$$

$$(4)' \quad (1 - \alpha^2)x - i(1 + \alpha^2)y - 2\alpha z = A(\alpha).$$

Quant à l'équation (5), on peut l'écrire

$$\mathbf{S} \frac{\partial^2 \xi}{\partial \alpha \partial \beta} x = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \alpha} \mathbf{S} x \frac{\partial \xi}{\partial \beta} + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \beta} \mathbf{S} x \frac{\partial \xi}{\partial \alpha},$$

ou bien, en tenant compte des équations (3)' et (4)' qui permettent d'exprimer le second membre exclusivement en fonction de  $\alpha$  et de  $\beta$ ,

$$(5)' \quad \left\{ \begin{array}{l} (\alpha - \beta)x + i(\beta - \alpha)y - (1 - \alpha\beta)z \\ = \frac{(1 + \alpha\beta)}{4} (A' + B') - \frac{\beta}{2} A - \frac{\alpha}{2} B. \end{array} \right.$$

Les coordonnées  $x, y, z$  de tout point de la surface ( $O$ ) seront donc fournies par les trois équations linéaires (3)', (4)' et (5)'.  
 Les formules (1) feront connaître ensuite les surfaces ( $M_1$ ) et ( $M_2$ ).

La recherche des surfaces focales de la congruence rectiligne

$(M_1, M_2)$  présente quelque intérêt. Examinons donc comment sont distribués les points focaux sur la droite  $M_1, M_2$ .

Nous avons pour les coordonnées d'un point quelconque de la droite  $M_1, M_2$

$$X, Y, Z = x, y, z + (\xi, \eta, \zeta)\rho.$$

Les développables de la congruence sont définies par l'équation qu'on obtient en éliminant  $\rho$  entre les équations

$$\frac{dx + \rho d\xi}{\xi} = \frac{dy + \rho d\eta}{\eta} = \frac{dz + \rho d\zeta}{\zeta},$$

ce qui donne, en ayant égard à l'identité (2),

$$d\xi^2 + d\eta^2 + d\zeta^2 = 0$$

ou

$$d\alpha d\beta = 0.$$

Les développables en question correspondent donc aux génératrices rectilignes de la sphère, et nous avons pour les  $\rho$  des points focaux

$$\rho_1 = - \frac{\sum \frac{\partial x}{\partial \alpha} \frac{\partial \xi}{\partial \beta}}{\sum \frac{\partial \xi}{\partial \alpha} \frac{\partial \xi}{\partial \beta}}, \quad \rho_2 = - \frac{\sum \frac{\partial x}{\partial \beta} \frac{\partial \xi}{\partial \alpha}}{\sum \frac{\partial \xi}{\partial \alpha} \frac{\partial \xi}{\partial \beta}}.$$

L'équation (5) nous montre d'ailleurs que l'on a

$$\rho_2 = -\rho_1;$$

par conséquent, les points focaux sont équidistants du milieu O.

3. Dans l'analyse précédente, nous avons supposé dès le début, en partant de l'identité (2), que les droites  $M_1, M_2$  étaient susceptibles d'avoir une direction quelconque, c'est-à-dire que le point  $(\xi, \eta, \zeta)$  pouvait occuper toute position sur la sphère de rayon unité; il convient maintenant d'étudier le cas où ce point décrit seulement une courbe sphérique  $\beta = f(\alpha)$ . La surface (O) qui correspond à cette courbe par orthogonalité des éléments sera nécessairement une développable.

D'ailleurs, l'équation (2) nous donne

$$\begin{aligned} \sum \left( \frac{\partial \xi}{\partial \alpha} + \beta \frac{\partial \xi}{\partial \beta} \right) \frac{\partial x}{\partial \alpha} &= 0, \\ \sum \left( \frac{\partial \xi}{\partial \alpha} + \beta \frac{\partial \xi}{\partial \beta} \right) \frac{\partial x}{\partial \beta} &= 0, \end{aligned}$$

et, en reprenant le calcul indiqué plus haut pour la recherche des développables de la congruence  $(M_1, M_2)$ , on voit que les développables d'une famille sont données par  $\beta = \text{const.}$  Elles correspondent donc aux génératrices de la développable  $(O)$ . On reconnaît en outre aisément que les points focaux relatifs à ces développables coïncident avec les milieux  $O$  des segments  $M_1, M_2$ .

Pour achever la question, considérons la surface  $(O)$  et rapportons-la aux courbes enveloppes ( $v = \text{const.}$ ) des droites  $M_1, M_2$ , et à leurs trajectoires orthogonales ( $u = \text{const.}$ ). Son élément linéaire sera de la forme

$$(6) \quad ds^2 = A^2 du^2 + C^2 dv^2.$$

Les coordonnées des points  $M_1$  et  $M_2$  s'écriront

$$(M_1) \quad x_1, y_1, z_1 = x, y, z + \frac{l}{2A} \frac{\partial(x, y, z)}{\partial u},$$

$$(M_2) \quad x_2, y_2, z_2 = x, y, z - \frac{l}{2A} \frac{\partial(x, y, z)}{\partial u}.$$

D'après l'hypothèse, les surfaces  $(M_1)$ ,  $(M_2)$  étant applicables l'une sur l'autre, nous devons avoir l'identité

$$dx_1^2 + dy_1^2 + dz_1^2 = dx_2^2 + dy_2^2 + dz_2^2,$$

qui s'écrit, après substitutions,

$$\int dx d\left(\frac{1}{A} \frac{\partial x}{\partial u}\right) = 0.$$

Développons et annulons les coefficients de  $du^2$ , de  $du dv$  et de  $dv^2$ ; nous obtiendrons

$$\begin{aligned} \int \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{1}{A} \frac{\partial x}{\partial u}\right) &= 0, \\ \int \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{1}{A} \frac{\partial x}{\partial u}\right) + \int \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{1}{A} \frac{\partial x}{\partial u}\right) &= 0, \end{aligned}$$

ou finalement, après réductions,

$$\frac{\partial A}{\partial v} = 0, \quad \frac{\partial C}{\partial u} = 0.$$

Par conséquent, l'élément linéaire (6) pourra s'écrire

$$(7) \quad ds^2 = du^2 + dv^2.$$

La surface focale (O) est donc une développable, comme nous l'indiquions plus haut, et les développables de la congruence (M<sub>1</sub>, M<sub>2</sub>) sont constituées par les plans tangents d'une part et les tangentes aux géodésiques  $v = \text{const.}$  de cette surface d'autre part.

Remarquons que ces géodésiques coupent une même génératrice ( $g$ ) de la surface (O) suivant le même angle; quand le point milieu (O) décrira la droite ( $g$ ), les points M<sub>1</sub> et M<sub>2</sub> décriront dans le même sens deux droites (G<sub>1</sub>) et (G<sub>2</sub>) parallèles à ( $g$ ) et équidistantes de cette dernière.

Il suit de là que les surfaces (M<sub>1</sub>) et (M<sub>2</sub>) sont réglées, qu'elles se correspondent par génératrices parallèles et de même sens.

Mais, comme le fait prévoir leur mode de génération, les surfaces réglées (M<sub>1</sub>) et (M<sub>2</sub>) ne sont pas quelconques; pour plus de précision, nous allons calculer les expressions de leurs coordonnées rectangulaires.

Soient

$$\begin{aligned} x &= a_1 u + b_1, \\ y &= a_2 u + b_2, \\ z &= a_3 u + b_3 \end{aligned}$$

les coordonnées d'un point quelconque de la développable (O).

Nous pouvons toujours supposer

$$\begin{aligned} a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 &= 1, \\ a_1'^2 + a_2'^2 + a_3'^2 &= 1, \\ a_1 b_1' + a_2 b_2' + a_3 b_3' &= 0; \end{aligned}$$

et la surface étant développable, nous aurons

$$\frac{a_1'}{b_1'} = \frac{a_2'}{b_2'} = \frac{a_3'}{b_3'} = -\frac{1}{z}.$$

Pour ramener l'élément linéaire de la surface (O) à la forme (7)

il faut effectuer les substitutions suivantes :

$$u' = u \cos(\nu + m) + \int \alpha \sin(\nu + m) d\nu,$$

$$\nu' = u \sin(\nu + m) - \int \alpha \cos(\nu + m) d\nu,$$

où  $m$  désigne une constante arbitraire.

Ceci posé, nous aurons pour les coordonnées du point  $M_1$ ,

$$x_1 = a_1 u + b_1 + \frac{\partial x}{\partial u},$$

$$y_1 = a_2 u + b_2 + \frac{\partial y}{\partial u},$$

$$z_1 = a_3 u + b_3 + \frac{\partial z}{\partial u},$$

ou bien

$$(M_1) \quad \left\{ \begin{array}{l} x_1 = a_1 u + b_1 + \frac{l}{2} [a_1 \cos(\nu + m) - a'_1 \sin(\nu + m)], \\ y_1 = a_2 u + b_2 + \frac{l}{2} [a_2 \cos(\nu + m) - a'_2 \sin(\nu + m)], \\ z_1 = a_3 u + b_3 + \frac{l}{2} [a_3 \cos(\nu + m) - a'_3 \sin(\nu + m)]. \end{array} \right.$$

Les coordonnées du point  $M_2$  s'obtiendront en changeant  $l$  en  $-l$  dans les expressions des coordonnées de  $M_1$ .

Les surfaces réglées  $(M_1)$  et  $(M_2)$  dépendent donc des deux fonctions arbitraires qui définissent la développable  $(O)$ .

---