

# ANNALES DE L'INSTITUT FOURIER

DANIEL SIBONY

## **Théorème de limites fines et problème de Dirichlet**

*Annales de l'institut Fourier*, tome 18, n° 2 (1968), p. 121-134

[http://www.numdam.org/item?id=AIF\\_1968\\_\\_18\\_2\\_121\\_0](http://www.numdam.org/item?id=AIF_1968__18_2_121_0)

© Annales de l'institut Fourier, 1968, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Annales de l'institut Fourier » (<http://annalif.ujf-grenoble.fr/>) implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme  
Numérisation de documents anciens mathématiques

<http://www.numdam.org/>

## THÉORÈME DE LIMITES FINES ET PROBLÈME DE DIRICHLET

par Daniel SIBONY

---

### Introduction.

On connaît le théorème de Fatou-Naim-Doob affirmant que sur un espace de Green toute fonction surharmonique positive possède une limite fine presque partout à la frontière de Martin; (cf. [4], [7]). Ce théorème a été étendu par K. Gowrisankaran (cf. [5]), au cadre de la théorie axiomatique de M. Brelot ([2]), grâce à la représentation intégrale et à l'introduction de filtres fins  $\mathcal{F}_h$  associés aux fonctions harmoniques minimales sous la forme suivante : pour toute fonction surharmonique  $v \geq 0$  et toute fonction harmonique  $u > 0$ ,  $\lim_{\mathcal{F}_h} \frac{v}{u}$  existe et est finie  $\mu_u$ -presque partout où  $\mu_u$  est la mesure qui assure la représentation intégrale de  $u$  dans une base fixée du cône des surharmoniques  $\geq 0$ ,  $\mu_u$  étant portée par l'ensemble des fonctions harmoniques minimales  $h$  de cette base.

Nous donnerons ici une extension de ce résultat avec un énoncé analogue dans un cadre assez général pouvant s'appliquer aux théories locales des fonctions surharmoniques telles que celle de M. Bauer [1], mais aussi aux théories des fonctions excessives où l'on sait faire la représentation intégrale (cf. les travaux de Kunita-Watanabe [6]). Notre théorème exclut donc toute considération de caractère local, et l'existence d'une limite fine de  $\frac{v}{u}$  pour  $u$  harmonique qu'il fournit en particulier, supposera dans les applications que l'on sache faire la

représentation intégrale des fonctions harmoniques seulement, ce qui est possible de manière assez rapide par le théorème de Choquet.

### Énoncé du résultat.

Sur un ensemble abstrait  $\Omega$  on se donne un cône convexe  $S$  de fonctions à valeurs dans  $[0, +\infty]$  et stable par enveloppe inférieure finie. On suppose que  $S$  est somme de deux cônes convexes  $S_1$  et  $S_2$  vérifiant les propriétés suivantes :

F 1. *Le cône  $S_1$  est complètement réticulé, réticulé pour son ordre propre, et archimédien pour l'ordre naturel.*

F 2. *Le cône  $S_1$  est affinement isomorphe à un cône faiblement complet, bien coiffé <sup>(1)</sup> d'un espace localement convexe.*

Cette condition est pour assurer que tout élément  $u \in S_1$  s'écrit comme résultante d'une *mesure conique* maximale — unique d'après F 1 — soit  $\mu_u$ , portée par les génératrices extrémales de  $S_1$  (cf. [3]),

$$u = \int h d\mu_u(h).$$

La mesure  $\mu_u$  est localisable sur des compacts de  $S_1$ , ce cône étant bien coiffé ([3]).

F 3. « *Commutation* » de la réduite avec la représentation intégrale.

Rappelons que la réduite de  $u \in S_1$  sur  $e \in \Omega$  relativement à  $S$  est la fonction  $R_u^e = \inf \{v \in S; v \geq u \text{ sur } e\}$ . La condition F 3 peut s'exprimer ainsi :

si  $u = \int h d\mu_u(h)$  ( $u \in S_1$ ), et  $v \in S$ ,  $a$  réel  $> 0$ , ou  $a \in S_1$  on a en posant  $e = \{v \leq a\}$  ou  $\{v > a\}$ ,

a)  $(R_u^e = u) \iff (R_h^e = h, \mu_u\text{-presque partout})$ , et

b) l'ensemble des  $h \in S_1$  extrémales telles que  $R_h^e \neq h$  est  $\mu_u$ -mesurable  $\forall u \in S_1$ .

F 4. *Propriété de domination* (cf. [5]).

Si  $u_1, u_2 \in S_1$  et  $v_1, v_2 \in S_2$ , alors la condition  $u_1 + v_1 \leq u_2 + v_2$

(1) Rappelons qu'un cône convexe  $C$  dans un e.l.c. est dit bien coiffé s'il est réunion de ses chapeaux, un chapeau étant un convexe compact de  $C$ , dont le complémentaire est convexe.

implique  $u_1 \leq u_2$ . En particulier cela entraîne que  $S$  est somme directe de  $S_1$  et de  $S_2$ .

Rappelons (cf. [5]) que si  $u \in S_1$  appartient à une génératrice extrême du cône  $S_1$ , et si  $e \in \Omega$  on dit que  $e$  est *effilé* en  $u$  si  $R_u^e \neq u$  et l'ensemble des complémentaires de parties effilées en  $u$  est un filtre [5] qu'on désignera par  $\mathcal{F}_u$ .

On peut alors énoncer le

**THÉORÈME.** — Soit  $S = S_1 + S_2$  vérifiant les conditions F 1, ... F 4. Alors pour tout  $u \in S_1$ ,  $u > 0$  et tout  $\nu \in S$ ,  $\lim_{\mathcal{F}_h} \frac{\nu}{u}$  existe et est finie presque partout pour la mesure  $\mu_u$  associée à  $u$ , et pour  $h$  dans l'ensemble des génératrices extrémales de  $S_1$ .

### Démonstration du théorème.

Remarquons qu'il suffit de faire la démonstration du théorème pour  $u = 1$ , puisque  $u$  étant supposé  $> 0$  dans  $\Omega$ , on peut diviser toutes les fonctions de  $S$  par  $u$ , le cône ainsi obtenu aura les mêmes propriétés que le premier. On supposera donc  $u = 1$  et pour établir l'existence de  $\lim_{\mathcal{F}_h} \nu$  ( $\mu_1 - pp$  ( $\mu_1$ : mesure conique représentant la fonction 1) pour  $\nu \in S$ , on l'établira d'abord pour  $\nu \in S_2$ , puis pour les éléments bornés de  $S_1$ , puis pour ceux qui sont dans la bande engendrée par 1 dans  $S_1$ .

On désignera par  $M$  l'ensemble des fonctions de  $S_1$  qui sont dans des génératrices extrémales, et on identifiera deux fonctions de la même génératrice.

a) On démontre d'abord l'existence d'une limite nulle  $\mu_1 - pp$  pour les éléments de  $S_2$ .

**PROPOSITION 1.** — Pour tout  $p \in S_2$ ,  $\lim_{\mathcal{F}_h} p = 0$ ,  $\mu_1 - pp$  pour  $h \in M$ .

*Preuve.* — Pour tout  $a$  réel  $> 0$ , soit  $M_a$  l'ensemble des  $h \in M$  tels que  $(p \leq a) \in \mathcal{F}_h$ . Du fait que  $M_a$  est mesurable pour  $\mu_1$  on peut considérer la fonction

$$u = \int_{M \setminus M_a} h d\mu_1(h)$$

qui est dans  $S_1$  et bornée par 1. On a  $R_u^{(p>a)} = u$ , car les  $h$  qui interviennent dans l'expression de  $u$  ne sont pas dans  $M_a$ . Donc

$$u \leq R_1^{(p>a)} \leq \inf\left(\frac{p}{a}, 1\right).$$

Comme  $\inf\left(\frac{p}{a}, 1\right) \in S_2$ , on a  $u = 0$ . Par suite, à un ensemble  $\mu_1$ -négligeable près, l'ensemble  $\bigcap_{a>0} M_a$  est identique à  $M$ , d'où le résultat.

b) On établit ensuite l'existence d'une limite fine pour les éléments bornés de  $S_1$ .

Soit  $S_{1,b}$  le cône des éléments bornés de  $S_1$ .

LEMME 2. — Soient  $u_1, u_2 \in S_{1,b}$  tels que  $1 = u_1 + u_2$ ,  $u_1$  et  $u_2$  étant des éléments étrangers pour l'ordre de  $S_1$ . Alors  $\lim_{\mathcal{F}_h} u_i$  existe  $\mu_1 - pp$ , ( $i = 1, 2$ ).

*Preuve.* — Soit  $q = \inf(u_1, u_2)$  en tout point. La fonction  $q$  est dans  $S_2$ , donc d'après la proposition 1,  $\lim_{\mathcal{F}_h} q = 0$   $\mu_1 - pp$ .

Il est clair que si  $\mu_{u_1}$  et  $\mu_{u_2}$  sont les mesures coniques représentant  $u_1$  et  $u_2$ , elles sont étrangères au sens que pour tout chapeau  $K$  de  $S_1$ , leurs localisées sur  $K$  le sont au sens habituel. Considérons les ensembles

$$e_1 = (u_1 \leq u_2), \quad e_2 = (u_2 < u_1).$$

On a  $R_{u_1}^{e_1} \leq q$ , donc  $e_1$  est effilé  $\mu_{u_1} - pp$  aux points  $h \in M$ . Donc  $e_2 = \int e_1 \in \mathcal{F}_h \mu_{u_1} - pp$  pour  $h \in M$ . De même

$$e_1 \in \mathcal{F}_h \mu_{u_2} - pp \quad \text{pour} \quad h \in M.$$

Par suite, il existe  $B \subset M$ , négligeable pour  $\mu_1$  tel que si  $h \in M \setminus B$ ,  $e_1$  ou  $e_2$  appartient à  $\mathcal{F}_h$ , c'est-à-dire :  $\sup(u_1, u_2)$ , qui possède une limite fine  $\mu_1 - pp$ , vaut  $u_1$  ou  $u_2$  sur un élément du filtre  $\mathcal{F}_h$ . Par suite  $\lim_{\mathcal{F}_h} u_i$  existe  $\mu_1 - pp$  pour  $h \in M$ .

PROPOSITION 3. — Pour tout  $u \in S_{1,b}$ ,  $\lim_{\mathcal{F}_h} u$  existe  $\mu_1 - pp$  pour  $h \in M$ .

*Preuve.* — Soit  $E = S_{1,b} - S_{1,b}$ . Cet espace vectoriel étant complètement réticulé, il est bien connu qu'on peut l'identifier à l'espace  $\mathcal{C}(X)$  des fonctions continues sur un espace  $X$  compact stonien. Soit  $\varepsilon > 0$  et  $u \in S_{1,b}$ . Il existe  $(\omega_i)_{i \leq n}$  un recouvrement fini de  $X$  tel que l'oscillation de  $u$  sur chaque  $\omega_i$  soit inférieure à  $\varepsilon$ , les  $\omega_i$  étant ouverts, fermés et deux à deux disjoints. Posons

$$u_\varepsilon = \sum_{i=1}^n \left( \inf_{x \in \omega_i} u(x) \right) \cdot 1_{\omega_i},$$

où  $1_{\omega_i}$  est la fonction caractéristique de l'ouvert  $\omega_i$ , qui est continue dans  $X$ , donc s'identifie à un élément  $u_i \in S_{1,b}$ . Il est clair qu'on a  $0 \leq u - u_\varepsilon \leq \varepsilon \cdot 1$ . Par suite toute  $u \in S_{1,b}$  est limite uniforme d'une suite  $(u_n) \subset S_{1,b}$  telle que chaque  $u_n$  s'écrive  $u_n = \sum_{i=1}^{k_n} \lambda_i u_n^i$  avec  $\sum_{i=1}^{k_n} u_n^i = 1$  pour tout  $n$ ,  $u_n^i$  et  $u_n^j$  étant étrangères pour  $i \neq j$ . D'après le lemme 2, chaque  $u_n$  a une limite fine  $\mu_1 - pp$ , donc aussi  $u$ .

c) Existence d'une limite fine pour tout élément de  $S$ .

LEMME 4. — Soit  $(r_n)$  une suite de nombres réels  $> 0$ , dense dans  $\mathbf{R}^+$ ; soit  $(p_n)$  la suite de fonctions sur  $\overline{\mathbf{R}^+}$  définie par  $p_n(t) = \inf(t, r_n)$  pour tout  $n$ . La suite  $(p_n)$  sépare  $\overline{\mathbf{R}^+}$  et pour tout  $\nu \in S$ , tout  $n$  entier,  $\lim_{\mathcal{F}_h} p_n \circ \nu$  existe  $\mu_1 - pp$  pour  $h \in M$ .

*Preuve.* — Pour tout  $n$  on a  $p_n \circ \nu = u_n + q_n$  où  $u_n \in S_1$  et  $q_n \in S_2$ , car  $p_n \circ \nu \in S$ . Du fait que  $u_n$  est borné,  $\lim_{\mathcal{F}_h} u_n$  existe  $\mu_1 - pp$  d'après la proposition 3 et  $\lim_{\mathcal{F}_h} q_n = 0$   $\mu_1 - pp$ .

LEMME 5. — Soit  $\nu \in S$ . L'ensemble des  $h \in M$  où

$$\lim_{\mathcal{F}_h} \nu = +\infty$$

est un ensemble  $\mu_1$ -négligeable.

*Preuve.* — Il suffit de supposer  $\nu \in S_1$ . Dire que  $\lim_{\mathcal{F}_h} \nu = +\infty$  signifie que pour tout  $n$ , l'ensemble  $\{\nu > n\}$  est non effilé en  $h$ . Si  $e = \{h \in M; \lim_{\mathcal{F}_h} \nu = +\infty\}$  et  $e_n = \{h \in M; (\nu > n)\}$

non effilé en  $h$ , (ces ensembles sont mesurables), on a :  
 $e = \bigcap_n e_n$ . Posons  $u_n = \int_{e_n} h d\mu_1(h)$ . On a  $R_{u_n}^{(\nu > n)} = u_n$  d'après  
 la condition F 3 a), donc

$$\int_{e_n} h d\mu_1(h) \leq R_1^{(\nu > n)} \leq \frac{\nu}{n};$$

par suite,  $S$  étant archimédien pour l'ordre naturel, on a

$$\int h d\mu_1(h) = 0,$$

c.q.f.d.

**PROPOSITION 6.** — *Pour tout  $\nu \in S$ ,  $\lim_{\mathcal{F}_h} \nu$  existe et est finie  $\mu_1 - pp$  pour  $h \in M$ .*

*Preuve.* — Pour tout  $h \in M$  soit  $\alpha(h)$  l'ensemble des valeurs d'adhérence dans  $\bar{\mathbf{R}}^+$  de la fonction  $\nu$  suivant le filtre  $\mathcal{F}_h$ . Soit, pour tout  $n$ ,  $\psi_n(h) = \lim_{\mathcal{F}_h} p_n \circ \nu$  qui est définie et finie  $\mu_1 - pp$ . On montre de manière standard que la fonction  $\psi_n$  est mesurable en raison de la condition F 3 b). Soit pour tout  $n$  un ensemble  $D_n \subset \mathbf{R}^+$  dénombrable et dense tel que pour tout  $a \in D_n$ ,  $\mu_1\{h \in M, \psi_n(h) = a\} = 0$ . Posons  $U_{a,n} = \{p_n \circ \nu > a\}$ , et pour toute partie  $e \subset \Omega$ ,  $M(e) = \{h \in M; e \in \mathcal{F}_h\}$ . On a

$$\mu_1\{M \setminus (M(U_{a,n}) \cup M(\bigcap U_{a,n}))\} = 0$$

pour tout  $n$  et tout  $a \in D_n$ ; car si  $h \in M$  est tel que  $\lim_{\mathcal{F}_h} p_n \circ \nu$  existe et si  $\psi_n(h) \neq a$ , alors on a  $U_{a,n} \in \mathcal{F}_h$  ou  $\bigcap U_{a,n} \in \mathcal{F}_h$  selon que  $\psi_n(h) > a$  ou  $\psi_n(h) < a$ .

Soit alors  $B = \bigcup_n \bigcup_{a \in D_n} \{M \setminus (M(U_{a,n}) \cup M(\bigcap U_{a,n}))\}$ ;  $B$  est  $\mu_1$ -négligeable. Soit  $h \in M \setminus B$ . Si  $\alpha(h)$  contenait deux points distincts  $y_1$  et  $y_2$ , il existerait  $n$  tel que  $p_n(y_1) \neq p_n(y_2)$ , donc  $a \in D_n$  tel que  $p_n(y_2) < a$  et  $p_n(y_1) > a$ . Il est clair que ni  $U_{a,n}$  ni  $\bigcap U_{a,n}$  n'appartiennent à  $\mathcal{F}_h$ , donc  $h \in B$ , ce qui contredit le choix initial de  $h$  dans  $M \setminus B$ , et achève la démonstration.

**Problème de Dirichlet associé aux filtres fins.**

Remarquons que tout  $u \in S_{1,b}$  peut s'écrire  $u = u_1 + u_2$  où  $u_1$  est dans la bande engendrée par 1 et  $u_2$  étrangère à 1. De plus, toute  $v \in S_1$  étrangère à 1 est telle que  $\lim_{\mathcal{F}_h} v = 0$   $\mu_1 - pp$ , car la fonction  $\inf(v, \lambda)$  pour tout  $\lambda$  réel  $> 0$  appartient à  $S_2$ .

**DÉFINITION.** — Une fonction numérique  $\varphi$  définie sur une partie  $A \subset S_1$  est dite conique si elle est constante sur toute intersection de  $A$  avec une génératrice du cône  $S_1$ .

Pour  $A \subset M$  on désignera par  $1_A$  la fonction (conique) qui vaut 1 sur toute génératrice passant par  $A$  et 0 sur toute génératrice disjointe de  $A$ .

Si  $A \subset M$  est  $\mu_1$ -mesurable,  $1_A \cdot \mu_1$  définit une mesure conique.

**PROPOSITION 7.** — Pour toute partie  $A \subset M$  qui est  $\mu_1$ -mesurable, si on pose

$$u = \int h \cdot 1_A(h) d\mu_1(h),$$

alors  $\lim_{\mathcal{F}_h} u = 1_A(h)$ ,  $\mu_1 - pp$ .

*Preuve.* — Soit  $A' = M \setminus A$  et  $u' = \int h 1_{A'}(h) d\mu_1(h)$ . On voit sans peine que  $u$  et  $u'$  sont étrangères. Donc  $\inf(u, u') \in S_2$  et par suite on a  $\lim_{\mathcal{F}_h} [\inf(u, u')] = 0$ ,  $\mu_1 - pp$ .

De plus  $\lim_{\mathcal{F}_h} u + \lim_{\mathcal{F}_h} u' = 1$   $\mu_1 - pp$ , donc en reprenant l'argument du lemme 2 sur les ensembles  $(u < u')$  et  $(u' \leq u)$  on en tire que  $\lim_{\mathcal{F}_h} u = 1_A$ ,  $\mu_1 - pp$ .

**PROPOSITION 8.** — Pour toute fonction bornée  $u \in S_1$ , si  $\hat{u}(h) = \lim_{\mathcal{F}_h} u$   $\mu_1 - pp$ , on a

$$(1) \quad u = \int h \hat{u}(h) d\mu_1(h).$$

*Preuve.* — Supposons que  $u = \sum_{i=1}^k \lambda_i u_i$  avec  $\sum_{i=1}^k u_i = 1$  et  $u_i$  étrangère à  $u_j$  si  $i \neq j$ . D'après la proposition précédente



on a la formule (1). Comme  $u$  est limite uniforme d'une suite de fonctions du type précédent, la proposition résulte de l'assertion suivante, qui est immédiate : si  $(u_n) \subset S_{1,b}$  converge uniformément dans  $\Omega$  vers  $u \in S_{1,b}$ , alors  $\hat{u}_n$  converge uniformément sur  $M$  vers  $\hat{u}$ , sauf sur l'ensemble  $\mu_1$ -négligeable où l'une des fonctions  $\hat{u}, \hat{u}_n$  n'est pas définie.

PROPOSITION 9. — Soit  $u \in S_1$  et  $u_1 \in S_{1,b}$ . Si

$$\lim_{\mathcal{F}_h} (u - u_1) \geq 0 \quad \mu_1 - pp,$$

alors on a  $u - u_1 \geq 0$ .

Preuve. — Soit  $\nu = \inf (u - u_1, 0) = \inf (u, u_1) - u_1$ . On a  $\nu = \omega + p - u_1$  où  $\omega \in S_{1,b}$  et  $p \in S_2$ , et  $\lim_{\mathcal{F}_h} \nu \geq 0$   $\mu_1 - pp$ . Donc  $\lim_{\mathcal{F}_h} (\omega - u_1) \geq 0$ , donc  $\omega \geq 0$ , et par suite  $\nu = 0$ . c.q.f.d.

PROPOSITION 10. — Soit  $u \in S_1$ ,  $u$  de base 1. Alors si  $\hat{u}(h) = \lim_{\mathcal{F}_h} u \quad \mu_1 - pp$ , on a

$$u = \int h \hat{u}(h) d\mu_1(h).$$

Preuve. — Soit  $u_n = \int h \inf(\hat{u}, n)(h) d\mu_1(h)$ . On a  $u_n \in S_{1,b}$  et  $\lim_{\mathcal{F}_h} (u - u_n) \geq 0 \quad \mu_1 - pp$ . Donc  $u_n \leq u$  pour tout  $n$ . Donc on peut passer à la limite et écrire

$$u = \int h \hat{u}(h) d\mu_1(h).$$

THÉORÈME 11. — Pour tout  $\nu \in S$ , si  $\hat{\nu}(h) = \lim_{\mathcal{F}_h} \frac{\nu}{u}$  (où  $u \in S_1, u > 0$ ), alors  $\hat{\nu}$  est  $\mu_u$ -intégrable et  $\frac{1}{u} \int h \hat{\nu}(h) d\mu_u(h)$  est le quotient par  $u$  de la composante de  $\nu$  dans la bande engendrée par  $u$  dans  $S_1$ . Réciproquement pour toute fonction conique  $\varphi$  sur  $M$  qui est  $\mu_u$ -intégrable, la fonction

$$\frac{1}{u} \int h \varphi(h) d\mu_u(h)$$

— quotient par  $u$  d'une fonction de  $S_1$  — a pour limite fine  $\mu_u - pp$  la fonction  $\varphi$ .

*Preuve.* — On peut supposer  $u = 1$ . Pour  $\nu \in S$  on écrit  $\nu = \nu_1 + \nu_2$ , où  $\nu_1 \in S_1$ ,  $\nu_2 \in S_2$  et  $\nu_1 = u_1 + u_2$  où  $u_1$  est dans la bande engendrée par 1 et  $u_2$  étrangère à 1. On a  $\lim_{\mathcal{F}_h} u_2 = \lim_{\mathcal{F}_h} \nu_2 = 0$   $\mu_1 - pp$ , et la proposition précédente montre que  $\hat{\nu} = \hat{u}_1$  est  $\mu_1$ -intégrable. Si on considère

$$\omega = \int h\hat{\nu}(h) d\mu_1(h),$$

$\omega$  est dans la bande engendrée par 1 dans  $S_1$ ; si  $s \in S_{1,b}$ ,  $s \leq \nu$ , on a  $\hat{s} \leq \hat{\nu}$ ,  $\mu_1 - pp$ , d'où

$$\omega = \int h\hat{\nu}(h) d\mu_1(h) \geq \int h\hat{s}(h) d\mu_1(h) = s \quad (\text{Prop. 8})$$

Donc  $\omega = u_1$ .

*Réciproque.* — Soit  $\nu = \int h\varphi(h) d\mu_1(h)$  et montrons que  $\hat{\nu} = \varphi$   $\mu_1 - pp$ . D'après la première partie,

$$\int h\hat{\nu}(h) d\mu_1(h) = \int h\varphi(h) d\mu_1(h)$$

car  $\nu$  est de base 1. D'après l'unicité de la représentation intégrale, on a  $\hat{\nu}(h) d\mu_1(h) = \varphi(h) d\mu_1(h)$ , et par suite  $\hat{\nu} = \varphi$   $\mu_1 - pp$ . c.q.f.d.

Le théorème précédent complète la proposition 6 et contient notre *théorème d'existence des limites fines*. De plus, il assure la résolution du *problème de Dirichlet*, puisque pour tout  $u \in S_1$ ,  $u > 0$  dans  $\Omega$ , et toute fonction  $\varphi \geq 0$  sur  $M$ , conique et  $\mu_u$ -sommable, il existe une fonction  $\nu \in S_1$ , à savoir  $\int h\varphi(h) d\mu_u(h)$ , dont le quotient par  $u$  possède une limite fine  $\mu_u - pp$  suivant les filtres fins  $\mathcal{F}_h$  qui est égale presque partout à la donnée-frontière  $\varphi$ .

Remarquons que la solution  $\frac{1}{u} \int h\varphi(h) d\mu_u(h)$  est celle que fournirait la méthode de Perron-Wiener-Brelot, c'est-à-dire que c'est l'enveloppe inférieure des fonctions  $\omega = \frac{\nu}{u}$  où  $\nu \in S$ , telles que  $\lim_{\mathcal{F}_h} \omega \geq \varphi(h)$   $\mu_u - pp$ .

Remarquons aussi que *l'unicité de la solution* du problème de Dirichlet pour une donnée frontière  $\varphi$ , qui est  $\mu_u$ -sommable, est assurée car elle l'est pour  $\varphi$  bornée et on passe au cas général au moyen de la proposition 9.

### Application.

1) *Allure des fonctions  $u$ -surharmoniques à la frontière minimale d'un espace harmonique.*

L'ensemble initial  $\Omega$  sera ici un espace harmonique de Bauer (cf. [1]) avec l'axiome de convergence de Doob; (on pourrait se placer dans un espace harmonique où pour tout ouvert  $U \subset \Omega$  l'espace  $\mathcal{H}_U$  des fonctions harmoniques dans  $U$  est nucléaire pour la topologie de la convergence compacte, ce qui suffit à assurer la représentation intégrale). On prend  $S_1 = H$ : cône des fonctions harmoniques  $\geq 0$  dans  $\Omega$  et  $S_2 = P$ , cône des potentiels dans  $\Omega$ .  $S = S_1 + S_2$  sera alors le cône des fonctions surharmoniques  $\geq 0$  dans  $\Omega$ . Il est clair que  $S$  est stable par inf, que les propriétés F 1 et F 4 sont vérifiées. La propriété F 2 de représentation intégrale des fonctions harmoniques  $\geq 0$  est un résultat de G. Mokobodzki (inédit). La propriété F 3 est une conséquence d'un résultat de G. Mokobodzki et D. Sibony [9] sur le caractère borélien de la fonction affine  $h \rightarrow \hat{R}_h(x)$ .

On peut énoncer le

**THÉORÈME 12.** — *Dans un espace harmonique de Bauer, pour toute fonction  $u$  harmonique  $u > 0$  dans  $\Omega$ , et toute fonction surharmonique  $v \geq 0$ ,  $\lim_{\mathcal{F}_h} \frac{v}{u}$  existe et est finie  $\mu_u$ -pp pour  $h$  harmonique minimale ( $\mathcal{F}_h$  étant le filtre fin associé à  $h$ ). De plus, pour toute fonction conique  $\varphi$  définie sur l'ensemble  $M$  des fonctions extrémales de  $H$ , et  $\mu_u$ -intégrable, la fonction  $\int h\varphi(h) d\mu_u(h) \in H$  et son quotient par  $u$  a une limite  $\mu_u$ -pp suivant les filtres  $\mathcal{F}_h$ , égale à  $\varphi, \mu_u$ -pp.*

2) *Allure en un point intérieur de certains quotients  $\frac{v}{u}$ .*

L'espace  $\Omega$  étant toujours un espace harmonique, soit  $x \in \Omega$  un point polaire et prenons maintenant  $S_1 =$  cône des potentiels à support  $\{x\}$  et  $S_2 =$  cône des surharmoniques  $\geq 0$  qui s'écrivent  $\sum v_n$  où  $v_n$  est à support compact disjoint de  $\{x\}$  pour tout  $n$ . On a toujours  $S_1 + S_2 = S$ , cône des fonctions surharmoniques  $\geq 0$  dans  $\Omega$ .

PROPOSITION 13. — Soient  $u, \nu, \omega \in S$  avec  $u \leq \nu + \omega$ . Alors il existe  $u_1, u_2 \in S$  tels que

$$u = u_1 + u_2 \quad \text{avec} \quad u_1 \leq \nu \text{ et } u_2 \leq \omega.$$

*Preuve.* — Supposons d'abord  $u, \nu, \omega$ , continues. Soient

$$\begin{aligned} u_1 &= \inf \{s \in S; s \geq u - \omega\} \\ u_2 &= \inf \{t \in S; t \geq u - u_1\}. \end{aligned}$$

Il est immédiat que  $u_1$  et  $u_2$  sont surharmoniques continues et que

$$u_1 = \inf \{s \in S; s \geq u - u_2\}.$$

On a donc  $u_1 \leq \nu, u_2 \leq \omega$ , et  $u \leq u_1 + u_2$ . Par un argument standard de théorie locale on voit que dans l'ouvert ( $u < u_1 + u_2$ )  $u_1$  et  $u_2$  sont harmoniques. Donc  $u$  étant supérieur à  $u_1 + u_2$  sur le support de  $u_1 + u_2$ , lui est supérieur partout.

Dans le cas général, soient  $(u_n), (\nu_n)$ , et  $(\omega_n) \subset S$  continues et croissant vers  $u, \nu$ , et  $\omega$  respectivement. Soit

$$u'_n = \inf (u_n, \nu_n + \omega_n).$$

$(u'_n)$  croît vers  $u$ . En appliquant nos considérations précédentes on peut écrire :

$$u'_n = u_n^1 + u_n^2$$

avec  $u_n^1 \leq \nu_n, u_n^2 \leq \omega_n, u_n^1$  et  $u_n^2$  surharmoniques  $\geq 0$  continues pour tout  $n$ . Le cône  $S$  étant saillant et faiblement complet, d'après un résultat de G. Choquet ([3]),  $(u_n^1)$  et  $(u_n^2)$  convergent vers  $u^1$  et  $u^2$  éléments de  $S$ , et on a  $u = u^1 + u^2$  avec  $u^1 \leq \nu$  et  $u^2 \leq \omega$ . c.q.f.d.

*Remarque.* — Cette propriété, remarquée par G. Mokobodzki en 1965 dans le cas de la théorie de Brelot, a été étudiée dans le cadre d'une théorie globale par G. Mokobodzki et D. Sibony ([8], où il est démontré qu'elle équivaut à la propriété d'additivité des réduites).

PROPOSITION 14. — La condition F 4 est vérifiée, c'est-à-dire si  $p, p' \in S_1$  et  $s, s' \in S_2$ , on a  $(p + s \leq p' + s') \Rightarrow (p \leq p')$ .

*Preuve.* — D'après la proposition précédente on peut écrire  $p = p_1 + p_2$  avec  $p_1 \leq p'$  et  $p_2 \leq s'$ , et  $p_1, p_2 \in S$ . Si  $p_2 \not\equiv 0$ , on aurait  $p_2 \in S_1$ , et  $p_2 \leq s' = \sum u_n$ ; soit  $y \neq x$ ,  $\varepsilon > 0$  et  $n_0$  tel que  $\sum_1^{n_0} u_n(y) + \varepsilon > \sum_1^\infty u_n(y)$ . On a

$$p_2(y) \leq \sum_1^{n_0} R_{u_n}^\omega(y) + \varepsilon$$

pour tout  $\omega$  ouvert,  $\omega \ni x$ . Donc  $p_2(y) \leq \varepsilon$ . Par suite  $p_2 = 0$ . c.q.f.d.

**PROPOSITION 15.** — *Le cône  $S_1$  est complètement réticulé pour son ordre propre.*

*Preuve.* — Soit  $(u_\alpha) \subset S_1$  un ordonné filtrant spécifiquement croissant avec  $u_\alpha \prec \omega \in S_1$  pour l'ordre de  $S_1$ . On a  $\omega = u_\alpha + u'_\alpha$ . Soit  $u = \sup_\alpha u_\alpha$  en tout point et  $u' = \inf'_\alpha u'_\alpha$ . On a  $u \in S$  et  $\omega = u + u' = u + \hat{u}'$  ( $\hat{u}'$  régularisé s.c.i.), donc  $u' = \hat{u}' \in S$ . Par suite  $u \in S_1$ . Pour  $\beta < \alpha$  on a  $u_\alpha = u_\beta + v_{\alpha, \beta}$ . Donc  $u = u_\beta + v_\alpha$ , où  $v_\beta = \sup_\alpha v_{\alpha, \beta}$ . Par suite  $v_\beta \in S_1$ , et  $u_\beta$  est majoré par  $u$  pour l'ordre de  $S_1$ , et si  $v \in S_1$  majore pour cet ordre tous les  $u_\alpha$ , on a  $v = u_\alpha + t_\alpha$ , donc  $v = u + t$ , avec  $t \in S$ , donc  $v$  majore  $u$  spécifiquement.

Il est clair d'autre part que  $S_1$  est réticulé, car si  $u_1, u_2 \in S_1$ , et  $u_1 \vee u_2$  est le sup de  $u_1$  et  $u_2$  pour l'ordre propre de  $S$ , qui est réticulé,  $u_1 \vee u_2$  est spécifiquement majoré par  $u_1 + u_2$ , donc est dans  $S_1$ .

La condition F 2 résulte de ce que  $S$  est faiblement complet métrisable pour une topologie convenable sur l'espace des différences de fonctions surharmoniques  $\geq 0$  et la propriété F 3 se déduit du résultat de ([9]) et peut s'établir rapidement.

On peut donc énoncer le

**THÉORÈME 16.** — *Dans un espace harmonique de Bauer  $\Omega$ , pour tout  $x \in \Omega$  polaire, toute fonction surharmonique  $v \geq 0$ , tout potentiel  $u > 0$  de support  $\{x\}$ ,  $\lim_{\mathcal{F}_x} \frac{v}{u}$  existe et est*

finie  $\mu_u - pp$  pour  $s$  décrivant les génératrices extrémales du cône  $S_1$  des potentiels de support  $\{x\}$ ,  $\mu_u$  étant la mesure conique associée à  $u$  dans la représentation intégrale dans  $S_1$ ,  $\mathcal{F}_s$  étant le filtre fin associé à l'élément extrémal  $s$  de  $S_1$ .

Pour toute  $\varphi$  fonction conique définie sur l'ensemble des génératrices extrémales du cône  $S_1$  et  $\mu_u$ -intégrable, la fonction  $p = \int s\varphi(s) d\mu_u(s)$  est dans  $S_1$  et  $\lim_{\mathcal{F}_s} \frac{p}{u} = \varphi$   $\mu_u - pp$ . Pour tout  $\nu \in S$ , si  $\nu = \nu_1 + \nu_2$  avec  $\nu_1 \in S_1$  et  $\nu_2 \in S_2$ , et si  $\psi(s) = \lim_{\mathcal{F}_s} \frac{\nu}{u} \mu_u - pp$ , la fonction

$$\frac{1}{u} \int s\psi(s) d\mu_u(s)$$

est la composante de  $\nu_1$  dans la bande engendrée par  $u$  dans  $S_1$ .

**COROLLAIRE 17.** — Si  $x$  est tel que les potentiels de support  $\{x\}$  sont proportionnels à  $u$ , alors pour tout  $\nu \in S$ ,  $\lim_{\mathcal{F}_u} \frac{\nu}{u}$  existe et est finie, où  $\mathcal{F}_u$  est le filtre minimal associé à  $u$ .

**Remarque 18.** — Le théorème subsiste évidemment quand on prend au lieu d'un point  $x$  un compact polaire  $K$ .

L'application à la théorie globale sera faite ultérieurement.

#### BIBLIOGRAPHIE

- [1] BAUER, Harmonische Räume, Springer Verlag, 1966.
- [2] BRELOT, Axiomatique des fonctions harmoniques, *Séminaire de Math. Sup.*, Montréal, été 1965.
- [3] CHOQUET, Les cônes faiblement complets dans l'analyse, *Proc. Int. Congr. Math., Stockholm* (1962).
- [4] DOOB, A non probabilistic proof of the relative Fatou theorem, *Ann. Unst. Fourier*, 9, 293-300 (1959).
- [5] K. GOWRISANKARAN, Extreme harmonic functions and boundary value problems, *Ann. I.F.* 13/2, (1963), 307-356.
- [5'] K. GOWRISANKARAN, Extreme harmonic functions, *Math. Z.* 94 (1966), 256-270.
- [6] KUNITA-WATANABE, Markov Processes and Martin boundary, *Illinois J. of Math.*, 9, n° 3, Sept. 1965.

- [7] Mme L. LUMER-NAÏM, Sur le théorème de Fatou généralisé, *Ann. Inst., Fourier* 12 (1962), p. 623.
- [8] G. MOKOBODZKI et D. SIBONY, Sur une propriété caractéristique des cônes de potentiels, *C.R. Acad. Sci.*, 266, 22 janvier 1968, p. 215.
- [9] G. MOKOBODZKI et D. SIBONY, Sur l'opération de réduite (à paraître).
- [10] D. SIBONY, Allure à la frontière de certaines transformations. et *C.R. Acad. Sci.*, 260, mars 1965.

Manuscrit reçu le 25 février 1968.

Daniel SIBONY  
Institut Henri-Poincaré, 11, rue P.-Curie,  
Paris, V<sup>e</sup>.

---