

---

---

# ANNALES DE MATHÉMATIQUES PURES ET APPLIQUÉES.

---

---

BRET

**Analyse algébrique. Théorie générale des fractions continues**

*Annales de Mathématiques pures et appliquées*, tome 9 (1818-1819), p. 37-51

[http://www.numdam.org/item?id=AMPA\\_1818-1819\\_\\_9\\_\\_37\\_0](http://www.numdam.org/item?id=AMPA_1818-1819__9__37_0)

© Annales de Mathématiques pures et appliquées, 1818-1819, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Annales de Mathématiques pures et appliquées » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme  
Numérisation de documents anciens mathématiques

<http://www.numdam.org/>

## ANALISE ALGÈBRIQUE.

*Théorie générale des fractions continues ;*

Par M. BRET , professeur à la faculté des sciences de Grenoble , Chevalier de l'Ordre royal de la Légion d'honneur.



LE problème du développement d'une fraction ordinaire en fraction continue , se réduit évidemment à la résolution de l'équation

$$\frac{B}{A} = \frac{b}{a} + \frac{b'}{a'} + \frac{b''}{a''} + \frac{b'''}{a'''} + \dots \quad (1)$$

dans laquelle nous supposons que  $A, B$  sont deux nombres entiers positifs donnés , tels qu'on ait  $A > B$  , et où  $a, a', a'', a''', \dots, b, b', b'', b''', \dots$  sont des nombres entiers indéterminés , positifs ou négatifs ; on peut toujours supposer , au surplus , que  $a, a', a'', a''', \dots$  sont positifs.

Posons successivement

$$\frac{B}{A} = \frac{b}{a} + \frac{b'}{a'} + \frac{b''}{a''} + \dots, \quad \frac{C}{B} = \frac{b'}{a'} + \frac{b''}{a''} + \frac{b'''}{a'''} + \dots, \quad \frac{D}{C} = \frac{b''}{a''} + \frac{b'''}{a'''} + \frac{b''''}{a''''} + \dots \quad (2)$$

il viendra ainsi

Tom. IX, n.° II, 1.<sup>er</sup> août 1818.

$$\frac{B}{A} = \frac{b}{a} + \frac{C}{B}, \quad \frac{C}{B} = \frac{b'}{a'} + \frac{D}{C}, \quad \frac{D}{C} = \frac{b''}{a''} + \frac{E}{D}, \dots (3)$$

c'est-à-dire,

$$\left. \begin{aligned} C &= Ab - Ba, \\ D &= Bb' - Ca', \\ E &= Cb'' - Da'', \\ &\dots \dots \dots ; \end{aligned} \right\} (4)$$

et la question se trouvera réduite à satisfaire en nombres entiers à cette suite d'équations, dans laquelle il est évident qu'on pourra prendre à la fois arbitrairement les dénominateurs  $a, a', a'', \dots$  et les numérateurs  $b, b', b'', \dots$  des fractions intégrantes.

Or, si l'on prend constamment  $b < a, b' < a', b'' < a'', \dots$ , la fraction continue se terminera nécessairement; en effet, on aura d'abord  $\frac{b}{a} < 1$ ; et, comme on aura aussi  $\frac{b'}{a'} < 1$ , il s'ensuit qu'on aura  $a + \frac{b'}{a'} > a - 1$ ; donc, on aura

$$\frac{b}{a} + \frac{b'}{a'} < \frac{b}{a-1};$$

mais  $\frac{b}{a-1}$  est au plus l'unité; donc, on aura

$$\frac{b}{a} + \frac{b'}{a'} < 1.$$

On aura, par la même raison,

$$\frac{b'}{a'} + \frac{b''}{a''} < 1;$$

done

$$a + \frac{b'}{a'} + \frac{b''}{a''} > a - 1 ;$$

et, par suite ;

$$\frac{b}{a} + \frac{b'}{a'} + \frac{b''}{a''} < \frac{b}{a-1} ;$$

d'où on conclura, comme ci-dessus,

$$\frac{b}{a} + \frac{b'}{a'} + \frac{b''}{a''} < 1 .$$

En continuant ainsi, de proche en proche, on parviendra à se convaincre que les portions de développement

$$\frac{b}{a} + \frac{b'}{a'} + \frac{b''}{a''} + \dots, \quad \frac{b'}{a'} + \frac{b''}{a''} + \frac{b'''}{a'''} + \dots, \quad \frac{b''}{a''} + \frac{b'''}{a'''} + \frac{b''''}{a''''} + \dots$$

sont toutes moindres que l'unité.

Il est pourtant un cas qui fait exception : c'est celui où l'on aurait précisément  $b = a - 1$ ,  $b' = -(a' - 1)$ ,  $b'' = -(a'' - 1)$ ,  $b''' = -(a''' - 1)$ , c'est-à-dire le cas où la fraction continue serait

$$\frac{a-1}{a} - \frac{a'-1}{a'} - \frac{a''-1}{a''} - \frac{a'''-1}{a'''} - \dots$$

et où, prolongée à l'infini, elle tendrait sans cesse vers l'unité : dans tout autre cas, elle sera constamment plus petite.

En appliquant présentement ce que nous venons de démontrer à la suite des équations (2), on voit que, si l'on a constamment, abstraction faite des signes,

$$b < a, \quad b' < a', \quad b'' < a'', \quad b''' < a''', \dots,$$

on aura aussi constamment, abstraction faite des signes,

$$\frac{B}{A} < 1, \quad \frac{C}{B} < 1, \quad \frac{D}{C} < 1, \dots;$$

c'est-à-dire,

$$B < A, \quad C < B, \quad D < C, \quad E < D, \dots;$$

les nombres  $A, B, C, D, \dots$  seront donc continuellement décroissans; et, comme ils sont tous entiers, il faudra enfin que l'un d'eux soit nul; ce qui prouve que la fraction continue se terminera.

Donc, si une fraction continue, dans laquelle les dénominateurs des fractions intégrantes sont constamment plus grands que leurs numérateurs, ne se termine pas, elle ne pourra être le développement d'une fraction finie, et sera conséquemment le développement d'un incommensurable.

Tout ce que nous venons de dire a encore lieu lors même que les numérateurs des fractions intégrantes sont d'abord plus grands que leurs dénominateurs, pourvu qu'ensuite ils deviennent plus petits qu'eux et demeurent constamment tels; il arrive seulement alors que la suite des nombres  $A, B, C, D, \dots$  est d'abord divergente; mais elle devient ensuite convergente et doit conséquemment se terminer à zéro, comme dans le premier cas.

Posons présentement

$$\frac{B}{A} = \frac{b}{a} + \frac{b'}{a'} + \dots + \frac{\beta}{\alpha}, \quad \frac{B'}{A'} = \frac{b}{a} + \frac{b'}{a'} + \dots + \frac{\beta}{\alpha} + \frac{\beta'}{\alpha'}, \quad \frac{B''}{A''} = \frac{b}{a} + \frac{b'}{a'} + \dots + \frac{\beta}{\alpha} + \frac{\beta'}{\alpha'} + \frac{\beta''}{\alpha''}, \dots$$

En réduisant la première de ces fractions continues en fraction ordinaire, on trouvera une expression de cette forme

$$\frac{B}{A} = \frac{P\beta + Q\alpha}{M\beta + N\alpha};$$

on passera de là à la valeur de  $\frac{B'}{A'}$ , en y changeant  $\alpha$  en  $\alpha + \frac{\beta'}{\alpha'}$ , ce qui donnera

$$\frac{B'}{A'} = \frac{P\beta + Q\left(\alpha + \frac{\beta'}{\alpha'}\right)}{M\beta + N\left(\alpha + \frac{\beta'}{\alpha'}\right)} = \frac{(P\beta + Q\alpha)\alpha' + Q\beta'}{(M\beta + N\alpha)\alpha' + N\beta'};$$

c'est-à-dire,

$$\frac{B'}{A'} = \frac{B\alpha' + Q\beta'}{A\alpha' + N\beta'} = \frac{Q\beta' + B\alpha'}{N\beta' + A\alpha'};$$

et l'on aura de même

$$\frac{B''}{A''} = \frac{B\beta'' + B'\alpha''}{A\beta'' + A'\alpha''};$$

d'où

$$B'' = B\beta'' + B'\alpha'', \quad A'' = A\beta'' + A'\alpha'';$$

Eliminant  $\alpha''$  entre ces deux équations, il viendra

$$A'B'' - B'A'' = -(AB' - BA')\beta'';$$

on aura donc, en général,

$$A'B'' - B'A'' = \pm bb'b'' \dots \beta\beta'\beta'';$$

le signe *plus* ou le signe *moins* aura lieu, suivant que le nombre des fractions intégrantes est *impair* ou *pair*, en les supposant du moins toutes positives.

Si nous prenons la différence entre deux fractions convergentes consécutives, nous aurons, abstraction faite des signes,

$$\frac{B''}{A''} - \frac{B'}{A'} = \frac{A'B'' - B'A''}{A'A''} = \frac{bb'b'' \dots \beta\beta'\beta''}{A'A''};$$

mais nous avons trouvé ci-dessus

$$A'' = A\beta'' + A'a'';$$

posant donc

$$\frac{A}{A'} \cdot \frac{\beta''}{a''} = a'' ,$$

ce qui donnera nécessairement  $a'' < 1$ ,

on aura

$$A'' = A'a''(1 + a'') ,$$

et l'on aurait semblablement

$$A' = Aa'(1 + a') ;$$

d'où on conclurait, en multipliant,

$$A'A'' = A'a'a''(1 + a')(1 + a'') ;$$

on aura donc généralement

$$A'' = aa'a'' \dots aa'a''(1 + a)(1 + a')(1 + a'') \dots (1 + a)(1 + a')(1 + a'') ;$$

$a, a', a''; \dots a, a', a''$  étant des quantités positives, plus petites que l'unité.

On aura donc ainsi

$$A'A'' = A'aa'a'' \dots aa'a''(1 + a)(1 + a')(1 + a'') \dots (1 + a)(1 + a')(1 + a'') ;$$

et par conséquent

$$\frac{B''}{A''} - \frac{B'}{A'} = \frac{1}{A'} \cdot \frac{\frac{b}{a} \frac{b'}{a'} \frac{b''}{a''} \dots \frac{\beta}{a} \frac{\beta'}{a'} \frac{\beta''}{a''}}{(1 + a)(1 + a')(1 + a'') \dots (1 + a)(1 + a')(1 + a'')} ;$$

et comme on les a inégalités.

$$b < a, b' < a', b'' < a'', \dots, \beta < a, \beta' < a', \beta'' < a'',$$

il s'ensuit que la différence  $\frac{B''}{A''} - \frac{B'}{A'}$  devient de plus en plus petite, à mesure qu'on s'avance dans la série des fractions convergentes, puisque d'ailleurs le dénominateur  $A'$  croît très-rapidement.

Cherchons présentement la différence entre la fraction  $\frac{B'}{A'}$  et la fraction continue

$$x = \frac{b}{a} + \frac{b'}{a'} + \frac{b''}{a''} + \dots + \frac{\beta}{a} + \frac{\beta'}{a'} + \frac{\beta''}{y}$$

$y$  étant quelconque, mais plus grand que  $\beta''$ . Il viendra

$$x - \frac{B'}{A'} = \frac{B'y + B\beta''}{A'y + A\beta''} - \frac{B'}{A'} = \frac{(BA' - AB')\beta''}{A'(A'y + A\beta'')} ;$$

on aura pareillement

$$x - \frac{B}{A} = \frac{B'y + B\beta''}{A'y + A\beta''} - \frac{B}{A} = \frac{(AB' - BA')y}{A(A'y + A\beta'')} ;$$

divisant ces deux équations l'une par l'autre, on trouve

$$\frac{x - \frac{B'}{A'}}{x - \frac{B}{A}} = - \frac{B\beta''}{A'y} ;$$

or, on a, par hypothèse,  $A' > A, y > \beta''$  ; donc  $x - \frac{B'}{A'}$  est moindre que  $x - \frac{B}{A}$ , et l'on voit de plus qu'ils sont des signes contraires ; ainsi, si l'on a  $x < \frac{B}{A}$ , on aura  $x > \frac{B'}{A'}$  et *vice versa* ; ainsi, dans tous



les cas, la valeur exacte de  $x$  se trouvera comprise entre deux fractions convergentes consécutives quelconques  $\frac{B}{A}$ ,  $\frac{B'}{A'}$ , mais plus voisine de la seconde que de la première; puis donc que, comme nous l'avons vu ci-dessus, la différence entre ces deux fractions décroît rapidement, à mesure qu'on s'avance dans la série des fractions convergentes, il s'ensuit qu'elles s'approchent aussi très-rapidement de la véritable valeur de  $x$  dont elles diffèrent alternativement par excès et par défaut, ce qui justifie pleinement leur dénomination.

Ce qui précède, suppose, à la vérité, que toutes les fractions intégrantes sont positives; mais, dans le cas contraire, il est toujours facile de transformer la fraction continue en une autre qui n'en renferme que de telles; on a, en effet,

$$a - \frac{q}{p} = (a-1) + \frac{1}{1 + \frac{q}{p-q}},$$

$$a - \frac{q}{p} - \frac{q'}{p'} = (a-1) + \frac{1}{1} + \frac{q}{p-q-1} + \frac{1}{1} + \frac{q'}{p'-q'};$$

$$a - \frac{q}{p} - \frac{q'}{p'} - \frac{q''}{p''} = (a-1) + \frac{1}{1} + \frac{q}{p-q-1} + \frac{1}{1} + \frac{q''}{p'-q'-1} + \frac{1}{1} + \frac{q''}{p''-q''};$$

et ainsi de suite.

On conclut de cette transformation que la nouvelle fraction continue remplira, à la fois, la condition de ne renfermer que des fractions intégrantes positives et celle de la convergence, si l'on a

$$\left. \begin{array}{l} q < p - q - 1, \\ q' < p' - q' - 1, \\ q'' < p'' - q'' - 1, \\ \dots \dots \dots; \end{array} \right\} \text{d'où} \left\{ \begin{array}{l} p > 2q + 1, \\ p' > 2q' + 1, \\ p'' > 2q'' + 1; \\ \dots \dots \dots \end{array} \right.$$

Il suffira même, quelles que soient d'ailleurs les premières fractions intégrantes, que ces conditions soient remplies, à partir de l'une quelconque d'entre elles; d'où l'on voit qu'en particulier la convergence vers une valeur fixe aura toujours lieu, lorsque les numérateurs  $q, q', q'', \dots$ , étant égaux et d'une grandeur quelconque, les dénominateurs  $p, p', p'', \dots$  croîtront constamment, quelque lentement que ce soit, à partir de l'un quelconque.

Voyons présentement comment on pourra procéder, d'une manière régulière, au développement en fraction continue d'une fonction quelconque de  $x$ . On pourrait bien supposer que la fonction dont il s'agit a d'abord été développée en série ascendante; mais, pour plus de généralité nous la supposerons développée en fraction, ayant de pareilles séries pour ses deux termes; c'est-à-dire que nous supposerons

$$y = \frac{B + B'x + B''x^2 + B'''x^3 + \dots}{A + A'x + A''x^2 + A'''x^3 + \dots};$$

alors, en posant successivement

$$\frac{B + B'x + B''x^2 + \dots}{A + A'x + A''x^2 + \dots} = \frac{B}{A + x} \cdot \frac{C + C'x + C''x^2 + \dots}{B + B'x + B''x^2 + \dots},$$

$$\frac{C + C'x + C''x^2 + \dots}{B + B'x + B''x^2 + \dots} = \frac{C}{B + x} \cdot \frac{D + D'x + D''x^2 + \dots}{C + C'x + C''x^2 + \dots},$$

$$\frac{D + D'x + D''x^2 + \dots}{C + C'x + C''x^2 + \dots} = \frac{D}{C + x} \cdot \frac{E + E'x + E''x^2 + \dots}{D + D'x + D''x^2 + \dots};$$

et ainsi de suite, on aura

$$y = \frac{B}{A} + \frac{Cx}{B} + \frac{Dx}{C} + \frac{Ex}{D} + \frac{Fx}{E} + \dots$$

Et l'on conclura les valeurs de  $C, D, E, F, \dots$  des valeurs connues de  $A, A', A'', \dots, B, B', B'', \dots$  au moyen des formules

$$\begin{aligned}
C &= BA' - AB', & C' &= BA'' - AB'', & C'' &= BA''' - AB''', & \dots, \\
D &= CB' - BC', & D' &= CB'' - BC'', & D'' &= CB''' - BC''', & \dots, \\
E &= DC' - CD', & E' &= DC'' - CD'', & E'' &= DC''' - CD''', & \dots, \\
& \dots, & & & & & \dots,
\end{aligned}$$

que l'on conclut des équations ci-dessus, en y chassant les dénominateurs, et exprimant ensuite qu'elles sont identiques.

Si les deux termes de la fraction valeur de  $\gamma$ , au lieu de procéder suivant les puissances de  $x$ , procédaient suivant celles de  $x^n$ , il ne s'agirait que d'y traiter  $x^n$  ainsi que nous venons de traiter  $x$  dans le développement général; et si une puissance de  $x$  se trouvait être facteur soit du numérateur soit du dénominateur, on la ferait préalablement passer soit comme diviseur soit comme multiplicateur de  $\gamma$ , ce qui ramènerait la question au premier cas.

Pour premier exemple, prenons la fonction

$$\text{Tang. } x = \frac{\text{Sin. } x}{\text{Cos. } x} = \frac{\frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \dots}{1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \dots};$$

nous écrirons d'abord

$$\frac{\text{Tang. } x}{x} = \frac{1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + \frac{x^8}{9!} - \dots}{1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \dots};$$

traitant alors  $x^2$  comme  $x$ , dans le second membre, il viendra

$$A = 1, \quad A' = -\frac{1}{2!}, \quad A'' = +\frac{1}{4!}, \quad A''' = -\frac{1}{6!}, \quad A'''' = +\frac{1}{8!}, \dots$$

$$B = 1, \quad B' = -\frac{1}{3!}, \quad B'' = +\frac{1}{5!}, \quad B''' = -\frac{1}{7!}, \quad B'''' = +\frac{1}{9!}, \dots$$

$$C = -\frac{2}{3!}, C' = +\frac{4}{5!}, C'' = -\frac{6}{7!}, C''' = +\frac{8}{9!}, \dots$$

$$D = +\frac{2.8}{3!5!}, D' = -\frac{4.12}{3!7!}, D'' = +\frac{6.16}{3!9!}, \dots$$

$$E = +\frac{2.8.48}{3!5!7!}, E' = -\frac{4.12.64}{3!5!9!}, \dots$$

$$F = -\frac{2.8.48.128}{3!5!7!9!}, \dots$$

Nous avons donc finalement

$$A = +1, B = +1, C = -\frac{1}{3}, D = +\frac{1}{45}, E = +\frac{1}{4725}, F = -\frac{1}{23395375}, \dots;$$

puis donc qu'on doit avoir

$$\frac{\text{Tang.}x}{x} = \frac{B}{A} + \frac{Cx^2}{B} + \frac{Dx^2}{C} + \frac{Ex^2}{D} + \frac{Fx^2}{E} + \dots$$

on aura

$$\frac{\text{Tang.}x}{x} = \frac{1}{1} - \frac{\frac{1}{3}x^2}{1} + \frac{\frac{1}{45}x^2}{-\frac{1}{3}} + \frac{\frac{1}{4725}x^2}{\frac{1}{45}} - \frac{\frac{1}{23395375}x^2}{\frac{1}{4725}} + \dots$$

ce qui donne, en amenant successivement les numérateurs à être entiers négatifs, et en multipliant ensuite par  $x^2$

$$x \text{Tang.}x = \frac{x^2}{1} - \frac{x^2}{3} - \frac{x^2}{5} - \frac{x^2}{7} - \frac{x^2}{9} - \frac{x^2}{11} - \dots$$

résultat dont la loi est manifeste; et qui, quel que soit  $x$ , satis-

fera à la condition de convergence, pourvu qu'on le pousse assez loin.

Si l'on transforme cette expression en une autre dont tous les termes soient positifs, d'après les formules trouvées ci-dessus, on obtiendra

$$\frac{\text{Tang.}x}{x} = \frac{1}{1} + \frac{x^2}{2-x^2} + \frac{1}{1} + \frac{x^2}{4-x^2} + \frac{1}{1} + \frac{x^2}{6-x^2} + \dots ;$$

d'où il suit que, pourvu que l'on prenne  $x^2 < 2-x^2$  ou  $x < 1$ , cette fraction continue convergera, à partir de l'origine, vers la véritable valeur de  $\frac{\text{Tang.}x}{x}$ ; dans tout autre cas, elle finira toujours par être convergente, pourvu qu'on la prolonge suffisamment.

Soit  $x = \frac{\pi}{4}$ , nous aurons  $\text{Tang.}x = 1$ , et notre formule deviendra

$$\frac{4}{\pi} = \frac{1}{1} - \frac{\left(\frac{\pi}{4}\right)^2}{3} - \frac{\left(\frac{\pi}{4}\right)^2}{5} - \frac{\left(\frac{\pi}{4}\right)^2}{7} - \frac{\left(\frac{\pi}{4}\right)^2}{9} - \dots$$

Nous savons qu'on a  $\frac{\pi}{4} < 1$ , soit donc, s'il est possible,  $\frac{\pi}{4} = \frac{n}{m}$ ,  $m$  et  $n$  étant deux nombres entiers premiers entre eux, tels que  $n < m$ ; il viendra, en substituant,

$$\frac{n}{m} = 1 - \frac{n^2}{3m^2} - \frac{n^2}{5} - \frac{n^2}{7m^2} - \frac{n^2}{9} - \frac{n^2}{11m^2} - \dots$$

or, cette équation est absurde; car son second membre est une fraction continue qui, ne se terminant pas et étant convergente, en la prolongeant suffisamment, doit avoir une valeur incommensurable, tandis que son premier membre est une fraction rationnelle;

il est donc absurde de supposer que  $\frac{\pi}{4}$  est égal à une pareille fraction,  $\pi$  est donc incommensurable.

Prenons, pour second exemple, la fonction

$$e^x = 1 + \frac{x}{1} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \dots ;$$

nous aurons ici

$$A = 1, A' = 0, A'' = 0, A''' = 0, A'''' = 0, \dots$$

$$B = 1, B' = 1, B'' = \frac{1}{2!}, B''' = \frac{1}{3!}, B'''' = \frac{1}{4!}, \dots$$

$$C = -1, C' = -\frac{1}{2!}, C'' = -\frac{1}{3!}, C''' = -\frac{1}{4!}, \dots$$

$$D = -\frac{1}{2!}, D' = -\frac{2}{3!}, D'' = -\frac{3}{4!}, \dots$$

$$E = -\frac{1}{2!3!}, E' = -\frac{2}{2!4!}, \dots$$

$$F = +\frac{1}{2!3!4!}, \dots$$

Nous aurons donc finalement

$$A = 1, B = 1, C = -1, D = -\frac{1}{2}, E = -\frac{1}{12}, F = +\frac{1}{144}, \dots$$

ce qui donnera, en substituant

$$xe^x = \frac{x}{1} - \frac{x}{1} + \frac{x}{2} - \frac{x}{3} + \frac{x}{2} - \frac{x}{5} + \frac{x}{2} - \frac{x}{7} + \frac{x}{2} - \frac{x}{9} + \dots$$

résultat dont la loi est manifeste.

On a, d'après cela

50 THÉORIE GÉNÉRALE DES FRACTIONS CONTINUES.

$$e = \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{5} + \frac{1}{2} - \frac{1}{7} + \frac{1}{2} - \frac{1}{9} + \dots$$

ce qui prouve que le nombre  $e$  est incommensurable.

On pourrait étendre cette théorie à d'autres exemples, non moins intéressans; mais, comme ces applications ne présentent aucune difficulté, nous terminerons par observer que, lorsque les numérateurs  $b, b', b'', \dots, \beta, \beta', \beta'', \dots$  sont supposés égaux à l'unité, les résultats auxquels nous sommes parvenus se simplifient d'une manière notable. C'est ainsi, par exemple, que l'équation

$$A'B'' - B'A'' = \pm bb'b'' \dots \beta\beta'\beta'' \dots$$

devient

$$A'B'' - B'A'' = \pm 1;$$

alors aussi les fractions convergentes se trouvent toutes réduites à leurs moindres termes, et la différence  $\frac{1}{AA'}$  entre deux fractions convergentes consécutives  $\frac{B}{A}, \frac{B'}{A'}$ , diminue de plus en plus, à mesure qu'on avance dans la suite que forment ces fractions; on peut aussi remarquer que le quotient

$$\frac{x - \frac{B'}{A'}}{x - \frac{B}{A}} = -\frac{A}{A'y},$$

est toujours moindre que l'unité, puisqu'on a, à la fois,  $y > 1$  et  $A' > A$ , d'où il suit que les conditions de la convergence de la fraction continue se trouvent nécessairement remplies. Si la fraction

## PARALLÉLOGRAMME ET PARALLÉLIPÈDE. 51

continue a quelques fractions intégrantes négatives, en la transformant en une autre qui ne présente plus cette circonstance, les conclusions seront encore les mêmes. Enfin, il est facile, dans le cas que nous examinons, de démontrer ce beau théorème, savoir : que chaque fraction convergente approche plus de la valeur totale de la fraction continue que ne pourrait le faire toute autre fraction, exprimée par de plus petits nombres. Nous ne faisons que rappeler cette propriété, pour montrer comment elle se rattache à la théorie nouvelle et plus générale des fractions continues que nous avons essayé de présenter dans ce mémoire.

---