

DEWULF

Rectification

Nouvelles annales de mathématiques 2^e série, tome 20
(1881), p. 480

http://www.numdam.org/item?id=NAM_1881_2_20__480_2

© Nouvelles annales de mathématiques, 1881, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de mathématiques » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

<http://www.numdam.org/>

RECTIFICATION.

L'observation faite par M. Genty (p. 370) sur la dernière partie de l'énoncé de la question 1306 est exacte, et cet énoncé doit être modifié comme il suit :

Les tangentes de rebroussement passent respectivement par les six points où les côtés du triangle ABC coupent la conique C_2 .

Ces tangentes sont faciles à construire. Soient γ_1 et γ_2 les points où AB coupe C_2 , la tangente de rebroussement qui passe par γ_1 est la droite qui joint ce point à celui où $\gamma_2 C$ coupe C_1 . DEWULF.