

# SÉMINAIRE HENRI CARTAN

H. CARTAN

**Relations entre les opérations précédentes et les opérations de Bockstein ; algèbre universelle d'un module libre gradué**

*Séminaire Henri Cartan*, tome 7, n° 1 (1954-1955), exp. n° 8, p. 1-9

[http://www.numdam.org/item?id=SHC\\_1954-1955\\_\\_7\\_1\\_A8\\_0](http://www.numdam.org/item?id=SHC_1954-1955__7_1_A8_0)

© Séminaire Henri Cartan  
(Secrétariat mathématique, Paris), 1954-1955, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la collection « Séminaire Henri Cartan » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme  
Numérisation de documents anciens mathématiques  
<http://www.numdam.org/>

RELATIONS ENTRE LES OPÉRATIONS PRÉCÉDENTES  
ET LES OPÉRATIONS DE BOCKSTEIN;  
ALGÈBRE UNIVERSELLE D'UN MODULE LIBRE GRADUÉ.  
(Exposé de H. CARTAN, 10-1-1955)

---

1.- Relations entre  $\sigma$ ,  $\chi_2$  et  $\psi_2$ .

Soit  $A$  une DGA- algèbre strictement anticommutative (en caractéristique 2) ; on a donc, dans  $\bar{B}(A)$ , un système de puissances divisées, définies, en tout cas, pour les éléments de degré  $\geq 2$ , et satisfaisant aux conditions (1), (2), (3), (4) et (5) de l'Exposé n° 7. De plus, si  $A$  est munie de puissances divisées (pour les éléments de degré  $\geq 2$ ), les puissances divisées  $\chi_k$  de  $\bar{B}(A)$  passent à l'homologie  $H_*(\bar{B}(A))$ .

Proposition 1.- Pour tout entier  $q \geq 1$ , l'application composée

$$H_{2q}(A) \xrightarrow{\sigma} H_{2q+1}(\bar{B}(A)) \xrightarrow{\chi_2} H_{4q+2}(\bar{B}(A)) ,$$

où  $\sigma$  désigne la suspension (Exposé n° 6), est égale à la transpotence  $\psi_2$  (Exposé n° 6). En formule :

$$(1) \quad \boxed{\psi_2 = \chi_2 \circ \sigma} \quad (\text{relation valable sur les éléments de degré pair } 2q \text{ de } H_*(A), q \geq 1).$$

Démonstration : Soit  $a \in A_{2q}$  tel que  $da = 0$ . Il existe un  $x \in \bar{B}_{2q+1}(A)$  unique, tel que  $dx = a$  ; la classe de  $\bar{d}$ -homologie de  $x$  est précisément la suspension  $\sigma$  de la classe d'homologie de  $a$ . Alors  $\chi_2(x)$  est l'unique élément  $y \in \bar{B}_{4q+2}(A)$  tel que  $dy = (dx).x = ax$ . Il résulte de la définition de la transpotence que la classe de  $\bar{d}$ -homologie de  $y$  est la transformée de la classe d'homologie de  $a$  par la transpotence  $\psi_2$ . C.Q.F.D.

Proposition 1 bis.- La relation (1) est encore vraie si  $A$  est une DGA- algèbre commutative de degré 0 telle que  $a^2 = (\xi a)^2$  pour tout  $a \in A$ , et si on applique les deux membres de (1) à un élément quelconque  $a \in A$ .

Autrement dit, l'application composée  $A \xrightarrow{\sigma} H_1(\bar{B}(A)) \xrightarrow{\chi_2} H_2(\bar{B}(A))$  est

égale à la transpotence  $\varphi_2$  (notée aussi  $\Psi$  dans l'Exposé n° 6). Démonstration analogue à celle de la proposition 1 : on écrit  $dx = a - \varepsilon a$ ,  $dy = (a - \varepsilon a)x$ .

Rappelons que la transpotence  $\varphi_p$  est additive pour  $p$  premier impair. Pour  $p = 2$ , la formule (1) permet de mettre en évidence la déviation de  $\varphi_2$  vis-à-vis de l'additivité : l'additivité de  $\sigma$  et la relation  $\gamma_2(x + y) = \gamma_2(x) + \gamma_2(y) + xy$  entraînent :

$$(2) \quad \varphi_2(a + b) = \varphi_2(a) + \varphi_2(b) + (\sigma a) \cdot (\sigma b) \quad .$$

Les résultats précédents s'appliquent aux algèbres d'Eilenberg-MacLane pour  $q \geq 1$ ,  $n \geq 1$ , la transpotence  $\varphi_2 : H_{2q}(\Pi, n; Z_2) \rightarrow H_{4q+2}(\Pi, n+1; Z_2)$  est composée de la suspension  $\sigma : H_{2q}(\Pi, n; Z_2) \rightarrow H_{2q+1}(\Pi, n+1; Z_2)$  et de  $\gamma_2 : H_{2q+1}(\Pi, n+1; Z_2) \rightarrow H_{4q+2}(\Pi, n+1; Z_2)$ . De même,  $\varphi_2 : {}_2\Pi \rightarrow H_2(\Pi, 1; Z_2)$  est composée de  $\sigma : {}_2\Pi \rightarrow H_1(\Pi, 1; Z_2)$  et de  $\gamma_2$  qui est précisément défini sur l'image de  $\sigma$ . Dans ce dernier cas, si  $\alpha$  et  $\beta$  sont deux éléments de  ${}_2\Pi$  (noté multiplicativement), on a :

$$(2') \quad \varphi_2(\alpha \beta) = \varphi_2(\alpha) + \varphi_2(\beta) + (\sigma \alpha) \cdot (\sigma \beta) \quad .$$

## 2.- Opérations de Bockstein.

Soit  $X$  un complexe, muni d'un opérateur différentiel de degré  $-1$ . On suppose que  $X$ , comme groupe abélien, est sans torsion ( $nx = 0$ , pour  $n$  entier  $\neq 0$ , entraîne  $x = 0$ ). Pour chaque entier  $n \neq 0$ , on a une suite exacte  $0 \rightarrow X \xrightarrow{n} X \rightarrow X/nX = X \otimes Z_n \rightarrow 0$  (où la notation  $n$  désigne la multiplication par  $n$ ).

Dans la suite exacte d'homologie correspondante, l'opérateur "bord"

$$\delta_n : H_q(X \otimes Z_n) \rightarrow H_{q-1}(X)$$

s'obtient comme suit : soit  $x \in X_q$  un cycle mod.  $n$ , donc  $dx = ny$  ( $y \in X_{q-1}$  est bien déterminé) ; la classe du cycle  $y$ , dans  $H_{q-1}(X)$  est la transformée, par  $\delta_n$ , de la classe de  $x$  dans  $H_q(X \otimes Z_n)$ . En fait, on va modifier la définition de  $\delta_n$ , et adopter désormais la convention suivante : on écrit  $dx = (-1)^q ny$ , et  $\delta_n$  transforme la classe d'homologie de  $x$  dans celle de  $y$ . L'introduction du facteur  $(-1)^q$  se justifiera plus loin (Proposition 2).

Le noyau de  $\delta_n$  est l'image de  $i_n : H_q(X) \rightarrow H_q(X \otimes Z_n)$ .

L'image de  $\mathcal{S}_n$  se compose des éléments de  $H_{q-1}(X)$  dont l'ordre divise  $n$ .

Considérons le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & X & \xrightarrow{n} & X & \longrightarrow & X \otimes Z_n \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & X \otimes Z_n & \xrightarrow{n} & X \otimes Z_{n^2} & \longrightarrow & X \otimes Z_n \longrightarrow 0 \end{array}$$

dont les lignes sont exactes. La deuxième ligne définit un homomorphisme  $\beta_n : H_q(X \otimes Z_n) \rightarrow H_{q-1}(X \otimes Z_n)$ , avec la même convention que ci-dessus (introduction du facteur  $(-1)^q$ ). Alors le diagramme montre que  $\beta_n = i_n \circ \mathcal{S}_n$ . Donc  $\beta_n \circ \beta_n = 0$ ; ainsi  $\beta_n$  peut être considéré comme un opérateur différentiel dans le complexe suivant :

$$\dots \rightarrow H_{q+1}(X \otimes Z_n) \xrightarrow{\beta_n} H_q(X \otimes Z_n) \xrightarrow{\beta_n} H_{q-1}(X \otimes Z_n) \rightarrow \dots$$

On notera que le noyau de  $\beta_n$  se compose des images, dans  $H_q(X \otimes Z_n)$ , des éléments de  $H_q(X \otimes Z_{n^2})$  : classes de cycles mod.  $n^2$ .

Proposition 2. - Soit  $A$  une DGA-algèbre sur l'anneau  $Z$  des entiers ; supposons que  $A$  possède une  $Z$ -base homogène. Considérons la suspension dans chacune des constructions acycliques  $\mathcal{B}(A)$  et  $\mathcal{B}(A \otimes Z_n) \approx \mathcal{B}(A) \otimes Z_n$ . Alors, pour  $q \geq 1$ , le diagramme suivant est commutatif :

$$\begin{array}{ccc} H_q(A \otimes Z_n) & \xrightarrow{\mathcal{S}_n} & H_{q-1}(A) \\ \downarrow \mathcal{G} & & \downarrow \mathcal{G} \\ H_{q+1}(\mathcal{B}(A) \otimes Z_n) & \xrightarrow{\mathcal{S}_n} & H_q(\mathcal{B}(A)) \end{array}$$

Autrement dit, l'opérateur de Bockstein  $\mathcal{S}_n$  commute avec la suspension. Corollaire immédiat :  $\beta_n$  commute avec la suspension.

Démonstration : la proposition pourrait être déduite d'un théorème général d'anticommutation (voir H. Cartan et S. Eilenberg, Homological Algebra, Ch. III, proposition 4.1). Nous allons faire un calcul explicite qui sera utile plus loin : soit  $a \in A_q$  tel que l'image  $a'$  de  $a$  dans  $A \otimes Z_n$  soit un cycle ; on a donc

$$da = (-1)^q nb, \quad b \in A_{q-1}.$$

Soit  $u \in \mathcal{B}_q(A)$  tel que  $du = b$  ; alors  $a + (-1)^{q+1} nu$  est un cycle de  $\mathcal{B}(A)$ , donc il existe  $x \in \mathcal{B}_{q+1}(A)$  tel que

$$dx = a + (-1)^{q+1} nu.$$

On a  $\bar{d}x = (-1)^{q+1} nu$ , donc la classe de  $\bar{d}$ -homologie de  $u$  est

transformée par  $\delta_n$  de la classe de  $\bar{d}$ -homologie de  $x'$ , image de  $x$  dans  $\bar{\mathcal{B}}(A) \otimes Z_n$ . D'ailleurs  $dx' = a'$ , donc la classe d'homologie de  $x'$  est transformée de celle de  $a'$  par suspension. Ceci prouve la proposition.

### 3.- Relation entre l'opération de Bockstein et la transpotence.

Soit  $p$  un entier premier (éventuellement égal à 2).

Proposition 3.- Soit  $A$  une DGA-algèbre anticommutative, ayant une  $Z$ -base homogène, et soit  $a \in A_0$  tel que  $a^p = (\xi a)^p$ . Soit  $a'$  l'image de  $a$  dans  $A' = A \otimes Z_p$ . Considérons la transpotence  $\varphi_p : {}_p(A'_0) \rightarrow H_2(\bar{\mathcal{B}}(A'))$ , et l'opérateur de Bockstein  $\delta_p : H_2(\bar{\mathcal{B}}(A')) \rightarrow H_1(\bar{\mathcal{B}}(A))$ . Alors

$$(3) \quad \delta_p \varphi_p(a') = (\xi a)^{p-1} (\sigma a) \quad , \quad \beta_p \varphi_p(a') = (\xi a')^{p-1} (\sigma a').$$

Démonstration : la deuxième relation résulte de la première par réduction mod.  $p$  ; prouvons la première. Soit  $x \in \bar{\mathcal{B}}_1(A)$  tel que  $dx = a - \xi a$ , et soit  $y \in \bar{\mathcal{B}}_2(a)$  tel que

$$dy = (a^{p-1} + (\xi a)a^{p-2} + \dots + (\xi a)^{p-1})x \quad .$$

Un tel  $y$  existe et est unique, puisque le second membre est un  $d$ -cycle. On a alors  $\bar{d}y = p(\xi a)^{p-1}x$ , et, par réduction mod.  $p$ , on obtient

$$dx' = a' - \xi a' \quad , \quad dy' = (a' - \xi a')^{p-1} x'$$

Ainsi la classe de  $\bar{d}$ -homologie de  $y'$  est la transpotence  $\varphi_p(a')$ , et si on effectue  $\delta_p$  sur cette classe, on trouve la classe de  $\bar{d}$ -homologie de  $(\xi a)^{p-1}x$ . Ceci démontre (3).

Corollaire : soit  $\Pi$  un groupe abélien. Identifions  $H_1(\Pi, 1; Z)$  à  $\Pi$  par la suspension (Exposé n° 6, n°3) ; alors l'application  $\delta_p \varphi_p$  de  ${}_p\Pi$  dans  $H_1(\Pi, 1; Z)$  n'est autre que l'injection  ${}_p\Pi \rightarrow \Pi$ . Et l'application  $\beta_p \varphi_p$  de  ${}_p\Pi$  dans  $H_1(\Pi, 1; Z_p)$  est l'application  ${}_p\Pi \rightarrow \Pi/p\Pi$  déduite de l'injection.

Théorème 1.- Soit  $A$  une DGA-algèbre anticommutative (au sens strict), ayant une  $Z$ -base homogène, et munie de puissances divisées (pour les éléments de degré pair  $\geq 2$ ). Soit  $\alpha \in H_{2q}(A \otimes Z_p)$ ,  $q \geq 1$  ; on a

$$(4) \quad \boxed{\beta_p \varphi_p(\alpha) = \sigma \gamma_p(\alpha) \in H_{2pq+1}(\bar{\mathcal{B}}(A) \otimes Z_p)} \quad , \quad \text{si } p \text{ premier impair,}$$

$$(5) \quad \boxed{\beta_2 \varphi_2(\alpha) = \sigma \gamma_2(\alpha) + (\beta_2 \sigma \alpha) \cdot (\sigma \alpha) \in H_{4q+1}(\bar{\mathcal{B}}(A) \otimes Z_2)} \quad \text{si } p = 2 \quad .$$

Démonstration : soit  $a \in A_{2q}$  tel que son image  $a' \in A \otimes Z_p$  soit dans la classe d'homologie  $\alpha$ . Reprenons les notations de la démonstration de la proposition 2, en y remplaçant  $q$  par  $2q$ , et  $n$  par  $p$ ; et observons que  $\overline{\mathcal{B}}(A)$  et  $\mathcal{B}(A)$  sont munies de puissances divisées (Exposé n° 6, théorème 1 et théorème 2). On a :

$$(6) \quad da = pb, \quad du = b, \quad dx = a - pu.$$

Puisque  $a - pu$  est un cycle,  $\gamma_p(a - pu)$  est un cycle, donc il existe  $z \in \overline{\mathcal{B}}_{2pq+1}(A)$  tel que

$$(7) \quad dz = \gamma_p(a - pu).$$

Alors  $pz - \gamma_{p-1}(a - pu).x$  est un cycle, puisque  $(a - pu).\gamma_{p-1}(a - pu) = p \gamma_p(a - pu)$ . Il existe donc un  $y \in \overline{\mathcal{B}}_{2pq+2}(A)$  tel que

$$(8) \quad dy = pz - \gamma_{p-1}(a - pu).x.$$

Par réduction mod.  $p$ , il vient

$$(9) \quad da' = 0, \quad dx' = a', \quad dz' = \gamma_p(a'), \quad dy' = a'^{p-1} x',$$

cette dernière relation résultant du fait que  $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ . Donc la classe de  $\overline{d}$ -homologie de  $y'$  est la transpotence  $\varphi_p(\alpha)$ .

D'autre part,  $y'$  provient, par réduction mod.  $p$ , de  $y$  qui satisfait, d'après (8), à

$$(10) \quad \overline{d}y = pz + (-1)^p p^{p-1} \gamma_{p-1}(u).x.$$

Supposons d'abord  $p$  premier impair;  $p^{p-1}$  est divisible par  $p^2$ , et (10) montre que le Bockstein  $\beta_p$  de la classe d'homologie de  $y'$  est la classe de  $\overline{d}$ -homologie de  $z'$ , laquelle, d'après (9), est la suspension de la classe d'homologie de  $\gamma_p(a')$ , donc est égale à  $\mathcal{G} \gamma_p(\alpha)$ . Ceci démontre (4).

Supposons ensuite  $p = 2$ . D'après (10), le Bockstein  $\beta_2$  de la classe de  $\overline{d}$ -homologie de  $y'$  est la classe de  $\overline{d}$ -homologie de  $z' + u' x'$ . Or, d'après la troisième relation (6),  $\overline{d}x = -2u$ , donc la classe d'homologie de  $u'$  est le Bockstein  $\beta_2$  de celle de  $x'$ ; et cette dernière, d'après la deuxième relation (9), est  $\mathcal{G}(\alpha)$ . D'où la relation (5) à démontrer.

Corollaire de la relation (4) : soit  $\alpha \in H_{2q}(A \otimes Z_p)$ ,  $q \geq 1$ ; pour  $p$  premier impair,  $\mathcal{G} \gamma_p(\alpha)$  est dans l'image de  $i_p : H_{2pq+1}(\overline{\mathcal{B}}(A)) \rightarrow H_{2pq+1}(\overline{\mathcal{B}}(A) \otimes Z_p)$ . D'une façon plus précise, l'application linéaire  $\mathcal{G} \gamma_p$  est composée de l'application linéaire  $\delta_p \varphi_p : H_{2q}(A \otimes Z_p) \rightarrow H_{2pq+1}(\overline{\mathcal{B}}(A))$ , et de l'application  $i_p$ .

Corollaire de la relation (5) : si  $\alpha \in H_{2q}(A \otimes Z_2)$ ,  $q \geq 1$ , et si  $\alpha$  est l'image d'un élément de  $H_{2q}(A \otimes Z_4)$ , alors

$$\sigma \gamma_2(\alpha) = \beta_2 \varphi_2(\alpha) = i_2 \delta_2 \varphi_2(\alpha) \quad .$$

Remarque 1.- L'application  $\alpha \rightarrow \delta_2 \varphi_2(\alpha)$  n'est pas additive, même sur l'espace vectoriel des  $\alpha$  tels que  $\beta_2(\alpha) = 0$ . En fait, la relation  $\varphi_2 = \gamma_2 \sigma$  (proposition 1 ci-dessus) entraîne

$$(11) \quad \delta_2 \varphi_2(\alpha + \alpha') = \delta_2 \varphi_2(\alpha) + \delta_2 \varphi_2(\alpha') + \delta_2((\sigma \alpha) \cdot (\sigma \alpha'))$$

pour  $\alpha, \alpha' \in H_{2q}(A \otimes Z_2)$ .

Remarque 2.- Soit  $N$  une algèbre différentielle graduée anticommutative (au sens strict), ayant une  $Z$ -base homogène, et munie de puissances divisées (pour les degrés pairs  $\geq 2$ ) compatibles avec la différentielle de  $N$ . Si  $\xi \in H_{2q}(N \otimes Z_2)$ ,  $q \geq 1$ , on a

$$(12) \quad \beta_2 \gamma_2(\xi) = \xi \cdot \beta_2(\xi) \quad .$$

En effet, soit  $x \in N_{2q}$  dont l'image  $x' \in N_{2q} \otimes Z_2$  appartient à la classe d'homologie  $\xi$ , et soit  $dx = 2y$ . On a  $d \gamma_2(x) = 2yx$ , d'où la relation (12).

Par contre, la relation (12) peut être en défaut pour  $\xi$  de degré impair : prenons par exemple  $\xi \in H_{2q+1}(\Pi, n; Z_2)$ ,  $n \geq 2$ , tel que  $\xi = \sigma(\alpha)$ ,  $\alpha \in H_{2q}(\Pi, n-1; Z_2)$ . D'après (5), et compte tenu de  $\varphi_2(\alpha) = \gamma_2 \sigma(\alpha) = \gamma_2(\xi)$ , on a

$$\beta_2 \gamma_2(\xi) = \xi \cdot \beta_2(\xi) + \sigma \gamma_2(\alpha) \quad .$$

#### 4.- L'algèbre universelle d'un module libre gradué.

Les notions ci-dessous ont pour but de permettre une description complète des algèbres  $H_*(\Pi, n; Z_p)$ , qui sera faite dans l'exposé suivant.

Soit un module libre (sur un anneau  $\wedge$  commutatif); notons  $E(M)$  l'algèbre extérieure de  $M$ , isomorphe au produit tensoriel (gauche) d'algèbres extérieures à un générateur (les générateurs étant les éléments de la base de  $M$ ). On supposera toujours que  $M$  est gradué, les éléments de la base de  $M$  étant homogènes de degré impair  $\geq 1$ . Alors  $E(M)$  a une graduation positive,  $E_0(M)$  étant réduit aux scalaires. D'après le théorème 2 de l'Exposé n° 7, il existe sur l'algèbre graduée  $E(M)$  un système unique de puissances divisées (définies pour les éléments de degré pair  $\geq 2$ ). En fait, d'après la formule (13) de l'Exposé n° 7, on a la formule explicite que voici :

si  $x = \sum_{1 \leq i \leq n} x_i$  est une somme d'éléments  $x_i \in E(M)$  de degré pair  $\geq 2$

on a

$$(13) \quad \chi_k(x) = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} x_{i_1} \dots x_{i_k} .$$

Ces  $\chi_k$  satisfont à la relation (5) de l'Exposé n° 7, en vertu de la Proposition 4 (Exposé n° 7).

Soit à nouveau  $M$  un module (non encore supposé gradué). Considérons l'algèbre tensorielle  $T(M) = \sum_{k \geq 0} T_k(M)$ , où  $T_k(M)$  est le module engendré par les  $x_1 \otimes \dots \otimes x_k$ , avec  $x_i \in M$ . Dans  $T(M)$ , considérons la multiplication  $*$  définie par la formule

$$(14) \quad (x_1 \otimes \dots \otimes x_k) * (y_1 \otimes \dots \otimes y_h) = \sum z_1 \otimes \dots \otimes z_{k+h} ,$$

la sommation du second membre étant étendue à toutes les suites

$(z_1, \dots, z_{k+h})$  déduites de la suite  $(x_1, \dots, x_k, y_1, \dots, y_h)$  par les permutations qui conservent l'ordre des  $x_i$  entre eux et l'ordre des  $y_i$  entre eux. La multiplication  $*$  est commutative et associative.

Pour chaque  $k$ , soit  $S_k(M)$  le sous-module de  $T_k(M)$ , formé des tenseurs symétriques (c'est-à-dire invariants par le groupe symétrique d'ordre  $k$ , qui opère d'une manière évidente sur  $T_k(M)$ ). Soit  $S(M) = \sum_{k \geq 0} S_k(M)$ . Il est évident que le produit  $*$  de deux éléments de  $S(M)$  est dans  $S(M)$ . Ainsi  $S(M)$  est une algèbre commutative.

Supposons désormais que  $M$  ait une base  $(e_i)$ , supposé totalement ordonnée. Il est immédiat que  $S_k(M)$  admet pour base l'ensemble des éléments  $e_{i_1 \dots i_k}$ , où  $i_1 \leq \dots \leq i_k$ , en notant  $e_{i_1 \dots i_k}$  la somme des éléments distincts déduits de  $e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_k}$  par permutation des facteurs (exemple :  $e_{111} = e_1 \otimes e_1 \otimes e_1$ ;  $e_{112} = e_1 \otimes e_1 \otimes e_2 + e_1 \otimes e_2 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_1 \otimes e_1$ ). Soit  $M_i$  le sous-module de  $M$  engendré par l'élément  $e_i$ ;  $S(M_i) = T(M_i)$  a pour base  $1, e_i, e_{ii} (= e_i \otimes e_i), e_{iii}, \dots$ . Les éléments de la base de  $S(M)$  s'écrivent d'une seule manière sous la forme

$$u_{i_1} * u_{i_2} * \dots * u_{i_k} , \text{ avec } i_1 < i_2 < \dots < i_k ,$$

en notant  $u_{i_k}$  un élément quelconque de la base de  $S(M_i)$ . Ceci prouve que l'application  $\otimes_i S(M_i) \rightarrow S(M)$ , déduite des injections  $M_i \rightarrow M$ , et de



la multiplication  $*$  de  $S(M)$ , est un isomorphisme d'algèbres.

Supposons maintenant que  $M$  soit gradué, les éléments  $e_i$  ayant des degrés pairs  $\geq 2$ . Alors  $S(M)$  est gradué ; de plus :

Proposition 4. - Il existe sur l'algèbre graduée commutative  $S(M)$  un système de puissances divisées satisfaisant aux conditions (1), (2), (3), (4), (5) de l'Exposé n° 7, et à la condition

$$(C) \quad \gamma_k(x) = x \otimes \dots \otimes x \quad (k \text{ fois}) \text{ pour } x \in M \quad .$$

Un tel système de puissances divisées est unique.

Démonstration : supposons qu'un tel système existe. Alors  $\gamma_k(e_i) = e_{i \dots i}$ , et, d'après la relation (5) de l'Exposé n° 7,  $S(M_i)$  est stable pour les  $\gamma_k$ , qui sont déterminés sans ambiguïté sur  $S(M_i)$  ;  $S(M_i)$  est alors isomorphe à l'algèbre des polynômes divisée à un générateur  $e_i$ . L'unicité des  $\gamma_k$  sur les sous-algèbres  $S(M_i)$  entraîne, d'après le théorème 2 de l'Exposé n° 7, l'unicité sur le produit tensoriel  $\otimes S(M_i) = S(M)$ . Démontrons maintenant l'existence : nous définissons d'abord les  $\gamma_k$  sur chaque sous-algèbre  $S(M_i)$ , identifiée à l'algèbre des polynômes divisée à un générateur  $e_i$ . Ces puissances divisées se prolongent au produit tensoriel  $\otimes S(M_i) = S(M)$ , d'après le théorème 2 de l'Exposé n° 7, et satisfont à (1), (2), (3), (4), (5) de l'Exposé n° 7 (cf. Proposition 4 de l'Exposé n° 7). Il reste à vérifier que les  $\gamma_k$  ainsi définis satisfont à la condition (C) de l'énoncé. Or si (C) est vérifiée pour deux éléments  $x$  et  $y$  de  $M$ , elle l'est pour  $x + y$  et pour  $\lambda x$  (quel que soit  $\lambda$  dans l'anneau de base) ; et comme (C) est vraie pour les  $e_i$ , (C) est vraie pour tout  $x \in M$ .

Nous pouvons maintenant définir l'algèbre universelle d'un module  $M$  ayant une base  $(e_i)$  formée d'éléments homogènes (de degrés  $> 0$ ). Soit  $M^-$  le sous-module engendré par les  $e_i$  de degré impair, et  $M^+$  le sous-module engendré par les  $e_i$  de degré pair. Soit  $U(M)$  le produit tensoriel  $E(M^-) \otimes S(M^+)$ , produit tensoriel d'algèbres graduées anticommutatives ; c'est une algèbre graduée anticommutative (au sens strict). Il existe sur  $U(M)$  un système unique de puissances divisées satisfaisant aux conditions (1), (2), (3), (4), (5) de l'Exposé n° 7, ainsi qu'à la condition (C) appliquée aux  $x \in M^+$  : cela résulte de ce qui précède et d'une nouvelle application du théorème 2 de l'Exposé n° 7. Comme algèbre anticommutative graduée munie de puissances divisées,  $U(M)$  possède la propriété universelle suivante :

