

BULLETIN DE LA S. M. F.

WILLIOT

Note sur le procédé le plus simple de calcul des nombres de Bernoulli

Bulletin de la S. M. F., tome 16 (1888), p. 144-149

http://www.numdam.org/item?id=BSMF_1888__16__144_1

© Bulletin de la S. M. F., 1888, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Bulletin de la S. M. F. » (<http://smf.emath.fr/Publications/Bulletin/Presentation.html>) implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

<http://www.numdam.org/>

*Note sur le procédé le plus simple de calcul des nombres
de Bernoulli; par M. WILLIOT.*

(Séance du 6 juin 1888.)

De nombreuses méthodes ont été proposées pour simplifier, autant que possible, le calcul des nombres de Bernoulli; mais il ne semble pas que l'on ait tiré un parti suffisant des remarquables formules de Seidel, généralisées par M. Stern.

M. E. Catalan, en démontrant le théorème de Staudt et Clausen, a signalé comme avantageux ⁽¹⁾ l'emploi des nombres entiers

(¹) *Bulletin des Sciences mathématiques*, 2^e série, T. IV (mars 1880).

et impairs P_n , déterminés par la formule

$$P_{2n} = 2(2^{2n} - 1)B_{2n};$$

mais les formules complexes qui lui servent au calcul de P_{2n} sont un obstacle à l'application de cette méthode. Déjà M. Édouard Lucas, après avoir démontré la seconde formule de Seidel (1),

$$(a) (2^{2n} - 1)B_{2n} + n_2(2^{2n-2} - 1)B_{2n-2} + n_4(2^{2n-4} - 1)B_{2n-4} + \dots = 0,$$

remarque que cette formule équivaut à l'expression symbolique

$$P^n(P + 1)^n = 0,$$

où les exposants doivent être transformés en indices après le développement.

Si l'on transforme, à l'aide de cette équation, les P_{2n} en déterminants, on constitue le Tableau suivant, formé très simplement au moyen des coefficients binomiaux :

$n = 3$	3 1 » » » » » » » » » »	3	1 0 0 0 0 0 0	0 0
4	1 6 1 » » » » » » » » »	- 17	0 1 0 0 0 0 0	0 0
5	» 5 10 1 » » » » » » » »	+ 155	0 0 1 0 0 0 0	0 0
6	» 1 15 15 1 » » » » » » »	- 2073	0 0 0 1 0 0 0	0 0
7	» » 7 35 21 1 » » » » » »	+ 38227	0 0 0 0 1 0 0	0 0
8	» » 1 28 70 28 1 » » » » »	- 929569	0 0 0 0 0 1 0	0 0
9	» » » 9 84 126 36 1 » » » »	+ 28620619	0 0 0 0 0 0 1	1
.	» » » 1 45 210 210 45 1 » » »
.	» » » 1 165 462 330 55 1 » » »
.	» » » 1 66 495 924 495 66 1 » » »
.

La réduction très facile de ce déterminant nous donne aisément dans la première colonne, en dehors de $P_2 = 1$, $P_4 = 2$, $P_6 = 3$, $P_8 = 17$, $P_{10} = 155$,

La simplification résultant de l'emploi de la formule (a) de M. Seidel est donc considérable; mais les nombres P_{2n} ont malheureusement une croissance bien plus rapide encore que celle des nombres de Bernoulli, et nous croyons plus avantageux d'avoir recours à l'autre formule de M. Seidel, en la transformant d'une façon analogue.

Cette formule

$$B^{n+1}(B + 1)^n + B^n(B + 1)^{n+1} = 0$$

(1) *Bulletin de la Société mathématique de France*, t. VIII, n° 5 (1880), p. 172.

donne par développement

$$\left(\frac{n}{1} + \frac{n+1}{1}\right) B_{2n} + [n_3 + (n+1)_3] B_{2n-2} + [n_5 + (n+1)_5] B_{2n-4} + \dots \left\{ \frac{B_n}{[1 + (n+1)] B_{n+1}} \right\} = 0,$$

selon que n est pair ou impair.

Or on a, identiquement,

$$n_p + (n+1)_p = (n+1)_p \times \frac{2n - p + 2}{n+1}.$$

On peut donc écrire, en faisant (1)

$$Q_{2n} = (2n+1) B_{2n},$$

$$\left(\frac{n+1}{n+1}\right)_1 Q_{2n} + \left(\frac{n+1}{n+1}\right)_3 Q_{2n-2} + \left(\frac{n+1}{n+1}\right)_5 Q_{2n-4} + \dots \left\{ \frac{1}{n+1} Q_n \right. \\ \left. \left\{ \frac{n+1}{n+1} Q_{+1n} \right\} \right\} = 0,$$

selon que n est pair ou impair. On supprimera le dénominateur commun $(n+1)$, et l'on pourra, en remarquant que les Q d'indice impair sont nuls, écrire symboliquement

$$Q^n (1+Q)^{n+1} = 0.$$

En admettant $Q_0 = 1$, $Q_1 = -1$, on peut développer en déterminant cette formule et poser

$$(2n+1) B_{2n} = Q_{2n} = \frac{(-1)^{n-1}}{1.2.3 \dots (n+1)} \begin{array}{c|cccccccccccc} 1 & 2 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & n=2 \\ \dots & 1 & 3 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 3 \\ \dots & \dots & 4 & 4 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 4 \\ \dots & \dots & \dots & 1 & 10 & 5 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 5 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & 6 & 20 & 6 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 6 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 1 & 21 & 35 & 7 & \dots & \dots & \dots & \dots & 7 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 8 & 56 & 56 & 8 & \dots & \dots & \dots & 8 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 1 & 36 & 126 & 84 & 9 & \dots & 9 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 10 & 120 & 252 & 120 & 10 & 10 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 1 & 55 & 330 & 462 & 165 & 11 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 12 & 220 & 792 & 792 & 220 & 12 \dots & 12 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array}$$

(1) Euler a rencontré la série de ces nombres Q_{2n} dans la sommation de la série

$$\frac{1}{1^{2n}} + \frac{1}{2^{2n}} + \frac{1}{3^{2n}} + \frac{1}{4^{2n}} + \dots = \frac{2^{2n-1} n^{2n}}{1.2.3 \dots (2n+1)} Q_{2n}.$$

